

کارشناسی (ستی و تجمعی)

تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشریحی: ۵

نام درس: آمار و احتمال - آمار و احتمال ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶ تشریحی: ۳

دشته تحصیلی / گذرس: آمار (۱۱۱۷۰۲۴) - ریاضی (محض و کاربردی: ۱۱۱۷۰۲۰)

علوم کامپیوتر (ستی و تجمعی: ۱۱۱۷۰۷۷)

مجاز است.

استفاده از ماشین حساب

گذسوال: یک (۱)

تنها با یاد اوست که دلها آرام می‌گیرد.

۱. کدام مقیاس اندازه گیری دارای صفر قرار دادی می‌باشد؟

د. نسبی

ج. فاصله ای

ب. ترتیبی

الف. اسمی

۲. خودروی مسیر اول را در که ۵۰ کیلومتر است در یک ساعت می‌رود و مسیر دوم که ۷۰ کیلومتر است نیز در یک ساعت طی می‌کند. میانگین سرعت خودرو چقدر است؟

۵۲/۶

۵۸/۳

۶۰

الف. ۷۵

۳. می‌خواهیم پراکندگی نمرات دروس آمار دانشجویان در یک کلاس را با پراکندگی وزن دانشجویان مقایسه کنیم. از کدام شاخص پراکندگی استفاده می‌کنیم؟

د. ضریب تغییر

ج. انحراف معیار

ب. واریانس

الف. دامنه

۴. طبق قاعده چبیشف حداقل چند درصد داده‌ها در فاصله $(\bar{X} - \frac{3}{2}S, \bar{X} + \frac{3}{2}S)$ قرار دارند؟ $\frac{4}{11}$ $\frac{7}{11}$ $\frac{4}{9}$ الف. $\frac{5}{9}$

۵. در یک توزیع اگر میانه از میانگین بزرگتر باشد وضعیت چوگانی آن توزیع چگونه است؟

ب. مثبت

الف. منفی

د. نیاز به داشتن مقدار نما (مُد) می‌باشد.

ج. صفر

۶. به چند طریق می‌توان ۶ پرچم متفاوت را دور یک میز گرد چید؟

۷۲۰.

ج. ۱۲۰

ب. ۲۴۰

الف. ۱۴۴۰

۴۰

ج. ۳۰

ب. ۲۰

الف. ۱۰

۷. در بند $(x_1 + x_2 + x_3)^m$ ضریب $x_1 x_2 x_3^m$ چقدر است؟

کارشناسی (ستی و تجمیع)

تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشریحی: ۵

نام درس: آمار و احتمال - آمار و احتمال ۱

دشته تحصیلی / گذ درس: آمار (۱۱۱۷۰۲۴) - ریاضی (محض و کاربردی: ۱۱۱۷۰۲۰)

علوم کامپیوتر (ستی و تجمیع: ۱۱۱۷۰۷۷)

گذ سوی سوال: یک (۱)

مجاز است.

استفاده از ماشین حساب

۱۰۰

۸. کدامیک از موارد زیر جزء اصول احتمال نمی باشد؟

الف. $p(S) = 1$ ب. اگر A_1, A_2, \dots دنباله ای متناهی و یا نامتناهی از پیشامدهای دو به دو ناسازگار باشند آن کاه

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots) = P(A_1) + P(A_2) + \dots$$

ج. $P(\phi) = 1$ د. برای هر زیر مجموعه S از A $P(A) \geq 0$:۹. اگر دو پیشامد A, B ناسازگار باشند و $P(B) = 0/4, P(A) = 0/3$ مقدار $P(A \cup B)$ چقدر است؟

د. ۰/۶۸

ج. ۰/۷

ب. ۰/۴

الف. ۰/۵۸

۱۰. اگر دو پیشامد A, B مستقل باشند و داشته باشیم $P(B) = 0/5, P(A) = 0/3$ مقدار $P(A | B)$ چقدر است؟

د. ۰/۵۵

ج. ۰/۶۵

ب. ۰/۳

الف. ۰/۸

۱۱. کارخانه ای محصول خود را از دو خط تولید می کند به طوری که ۷۰٪ محصولات از خط A و ۳۰٪ از خط B می باشند اگر به ترتیب ۳ و ۲ درصد محصولات خط A و B معیوب باشند. با انتخاب یک کالا از محصولات این کارخانه چقدر احتمال دارد که معیوب باشد.

د. ۰/۰۲۷

ج. ۰/۰۵

ب. ۰/۰۶

الف. ۰/۰۱۸

۱۲. در سوال قبل به شرط آنکه کالای انتخاب شده معیوب است چقدر احتمال دارد که از خط B آمده باشد.د. $\frac{6}{27}$ ج. $\frac{21}{27}$ ب. $\frac{1}{27}$ الف. $\frac{5}{27}$ ۱۳. اگر متغیر X داری توزیع احتمال روبرو باشد مقدار $E(2X + 14)$ چقدر است؟

x	-۲	۰	۲	۴
$f(x)$	۰/۲	۰/۳	۰/۲	۰/۳

الف. ۵/۲

د. ۱/۲

ج. ۶/۴

کارشناسی (ستی و تجمعی)

تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشریحی: ۵

نام درس: آمار و احتمال - آمار و احتمال ۱

دشته تحصیلی / گذرس: آمار (۱۱۱۷۰۲۴) - ریاضی (محض و کاربردی: ۱۱۱۷۰۲۰)

علوم کامپیوتر (ستی و تجمعی: ۱۱۱۷۰۷۷)

گذ سوی سوال: یک (۱)

مجاز است.

استفاده از ماشین حساب

الف. ۴/۹۶

ب. ۶/۶۸

ج. ۱/۲۰

د. ۲/۷

۱۴. در سوال قبل مقدار انحراف استاندارد $(7 + 3X)$ چقدر است؟الف. $\frac{t}{t-1}$ ب. $\frac{t}{1-t}$ ج. $\frac{1}{1-t}$ د. $\frac{1}{t-1}$

۱۵. اگر متغیر X دارای تابع چگالی $f(x) = e^{-x}$, $x > 0$ باشد تابع مولد گشتاور آن کدام گزینه است؟

۱۶. در جعبه‌ای ۷ عدد ساعت قرار دارد که سه تای آن معیوب است از بین آنها ۲ ساعت به تصادف انتخاب می‌کنیم واریانس تعداد ساعت‌های سالم چقدر است؟

الف. ۳۵

ب. ۲۹۴

ج. ۲۵

د. ۴۹

الف. ۱۵

ب. ۷۰

ج. ۱۷

د. ۲۰

۱۷. اگردو درصد از کتابهای که در یک صحافی جلد شده اند بد صحافی شده باشند، با استفاده از تقریب پواسن برای توزیع دو جمله‌ای احتمال آن را تعیین کنید که هیچ کتابی از بین ۴۰۰ کتاب صحافی شده بد صحافی نشده باشد.

الف. $\frac{e^{-\lambda}}{\lambda!}$ ب. $2e^{-\lambda}$ ج. $e^{-\lambda}$ د. $e^{-2\lambda}$ ۱۸. اگر متغیر تصادفی Y دارای تابع مولد گشتاور $M_X(t) = e^{\lambda(e^{t-1})}$ باشد مقدار واریانس آن کدام گزینه است؟الف. λ ب. λ^2 ج. $\frac{\lambda^2}{2}$ د. $\frac{1+\lambda}{2}$

۱۹. اگر متغیر تصادفی X دارای چگالی $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\pi} & 1 < x < 4 \\ 0 & \text{سایر جاهای} \end{cases}$ باشد. مقدار $Var(X)$ چقدر است؟

الف. $\frac{1}{12}$ ب. $\frac{3}{4}$ ج. $\frac{4}{5}$ د. $\frac{3}{12}$

کارشناسی (ستی و تجمعی)

تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشریحی: ۵

نام درس: آمار و احتمال - آمار و احتمال ۱

دشته تحصیلی / گذرس: آمار (۱۱۱۷۰۲۴) - ریاضی (محض و کاربردی: ۱۱۱۷۰۲۰)

علوم کامپیوتر (ستی و تجمعی: ۱۱۱۷۰۷۷)

گذرسی سوال: یک (۱)

مجاز است.

استفاده از ماشین حساب

۲۰. اگر متغیر تصادفی X دارای تابع مولد گشتاور $M_X(t) = e^{\frac{\mu t + \frac{1}{2}\sigma^2 t^2}{\sigma}}$ کدام

گزینه است؟

د. $e^{\mu t + \frac{1}{2}t^2}$

ج. e^{2t}

ب. $e^{\frac{1}{2}t^2 \sigma^2}$

الف. $e^{\frac{1}{2}t^2}$

سوالات تشریحی

۱. قضیه: برای هر k, m و n صحیح مثبت ثابت کنید. (۱/۵ نمره)

$$\sum_{r=0}^k \binom{m}{r} \binom{n}{k-r} = \binom{m+n}{k}$$

۲. چگالی توأم دو متغیره X, Y در رو برو را در نظر بگیرید.الف. $E(Y), E(X)$ و $cov(X, Y)$ را بدست آورید.ب. آیا متغیرهای y, X از هم مستقل هستند. (۱/۵ نمره)

$X \backslash Y$	۱	۲	۳
۱	۰	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$
۲	$\frac{1}{6}$	۰	$\frac{1}{6}$
۳	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشریحی: ۵

نام درس: آمار و احتمال - آمار و احتمال ۱

دشته تحصیلی / گذرس: آمار (۱۱۱۷۰۲۴) - ریاضی (محض و کاربردی: ۱۱۱۷۰۲۰)

علوم کامپیوتر (ستی و تجمیع: ۱۱۱۷۰۷۷)

گذ سوی سوال: یک (۱)

مجاز است.

استفاده از ماشین حساب

$$F(X) = \begin{cases} 1 - (1+x)e^{-x} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$$

تابع توزیع متغیر تصادفی X به صورت

$$P(1 < X < 3)$$

(۱/۵ نمره)

۴. اگر متغیر X دارای تابع احتمال دو جمله ای با پارامترهای n و θ باشد تابع مولد گشتاور آن را بدست آورید.

(۱ نمره)

۵. اگر X و Y دارای توزیع نرمال دو متغیره باشند و $V = X - Y$ و $U = X + Y$ باشد. برای ضریب همبستگی U و V عبارتی بیابید.

(۱/۵ نمره)

شماره سوال	پاسخ صحیح
1	ج
2	ج
3	د
4	الف
5	الف
6	ج
7	ب
8	ب
9	ب
10	ب
11	د
12	د
13	ج
14	ب
15	د
16	د
17	ج
18	الف
19	ب
20	الف

امار و احتمال ۱ نیمسال دوم ۸۹-۹۰