

کارشناسی

حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است

www.arzan3.ir

سوال ۲۰

۲۰.۱۲

زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰

تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰

عنوان درس : کاربرد آمار و احتمالات در برنامه ریزی شهری

رشته تحصیلی / گد درس : جغرافیا و برنامه ریزی شهری (جدید) ۱۲۱۶۴۳۸

استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است

۱- فرض کنید جامعه ای دارای ۵ عضو باشد. چند نمونه ۳ تایی متمایز می‌توان از این جامعه انتخاب کرد؟

۲۵ .۴ ۱۰ .۳ ۱۵ .۲ ۲۰ .۱

۲- کدام یک از موارد زیر جزو روش‌های نمونه‌گیری نیست؟

۱. نمونه‌گیری خوشه‌ای
 ۲. نمونه‌گیری طبقه‌بندی
 ۳. نمونه‌گیری سیستماتیک
 ۴. نمونه‌گیری پی در پی

۳- در چه حالتی چولگی توزیع دو جمله‌ای بیشتر است؟

۱. هر چه نسبت به صفر نزدیکتر باشد
 ۲. هر چه نسبت به صفر یا یک نزدیکتر باشد
 ۳. هر چه نسبت به نیم نزدیکتر باشد

۴- نسبت پذیرفته شدگان ارشد دانشجویان جغرافی $\frac{1}{4}$ است. اگر توزیع پذیرفته شدگان دو جمله‌ای باشد. برای $n=12$ ، مقدار σ_x برابر با:

۲/۵ .۴ ۰/۷۵ .۳ ۱/۵ .۲ ۰/۵ .۱

۵- اطلاعات موجود در نمونه را که برای استنباط آماری به کار می‌بریم، چه نامیده می‌شود؟

۱. آماره
 ۲. پارامتر
 ۳. برآورد
 ۴. فرض

۶- در چه حالتی برآوردگر ناریب است؟

۱. وقتی امید ریاضی برآوردگر برابر با مقدار پارامتر نباشد
 ۲. وقتی امید ریاضی برآوردگر بزرگتر از مقدار پارامتر نباشد

۷- در جامعه ای نرمال با واریانس ۴، جداول خطا برای نمونه به حجم ۲۵ با اطمینان ۹۵٪ برابر است با: (عدد جدول $(1/96)^4$)۰/۱۷ .۴ ۱/۹۶ .۳ ۱/۹۶ $\times \frac{1}{5}$.۲ ۱/۹۶ $\times \frac{2}{5}$.۱۸- حجم نمونه در جامعه نرمال با واریانس ۲۵ با اطمینان ۹۵٪ با خطای $1/5$ برابر با: (عدد جدول تقریباً ۲ است)

۴۰۰ .۴ ۲۰۰ .۳ ۳۰۰ .۲ ۱۰۰ .۱

کارشناسی

حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است

www.arzan3.ir

دانشکده پیام نور

مرکز آموزن و سنجش

دانشکده پیام نور

سوال ۱: یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۲۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: کاربرد آمار و احتمالات در برنامه ریزی شهری

رشته تحصیلی/ گذ درس: جغرافیا و برنامه ریزی شهری (جدید) ۱۲۱۶۴۳۸

۹- اگر بخواهیم نسبت خانوارهای اجاره نشین در یک شهر را تعیین کنیم و ۹۹ درصد مطمئن باشیم که حداقل مقدار خطای صدم است، اندازه نمونه تصادفی حدوداً چقدر می‌شود؟

۱۸۶ . ۴

۲۶۶ . ۳

۴۶۲ . ۲

۳۷۱ . ۱

۱۰- برای برآورد تعداد ماهی‌های یک برکه، ۱۰۰ ماهی صید و پس از برچسب گذاری مجدداً در برکه رها می‌شود در نمونه ۱۰۰ گیری مجدداً از ۱۰۰ مشخص شد که ۷ ماهی برچسب دار هستند مقدار کل ماهی‌های برکه چقدر است؟

۱۳۲۹ . ۴

۱۴۲۹ . ۳

۱۲۲۹ . ۲

۱۱۲۹ . ۱

۱۱- اگر بازه برای میانگین جامعه نرمال به صورت زیر باشد.

$$\left(1270 - \frac{1}{\sqrt{75}} \right)^{\frac{150}{150}}, \left(1270 + \frac{1}{\sqrt{75}} \right)^{\frac{150}{150}}$$

طول بازه برابر با:

۵۶/۸۱ . ۴

۲۵/۲۳ . ۳

۱۲۷۰ . ۲

۲۵۴۰ . ۱

۱۲- برآورد بازه ای میانگین جامعه برای یک نمونه کوچک با حجم ۱۲، میانگین نمونه ای ۶، میزان خطای $\sigma = 1/796$ چقدر می‌شود؟

(۵/۶۴ ، ۶/۳۶ . ۴

(۵/۸ ، ۶/۲ . ۳

(۴/۶۱ ، ۷/۷۹ . ۲

(۴/۲ ، ۷/۸ . ۱)

بازه اطمینان برای σ باشد. بازه اطمینان برای σ برابر با:
$$\left[\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha/2}^2}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2} \right]$$
 اگر -13

 $(n-1)S^2, (n+1)S^2$

$$\left[\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha/2}^2}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2} \right] . 1$$

$$(S \sqrt{\frac{n-1}{\chi_{\alpha/2}^2}}, S \sqrt{\frac{n-1}{\chi_{1-\alpha/2}^2}}) . 4$$
 $(-1, 1) . 3$

۱۴- یک فرض آماری چیست؟

- ۱. هر ادعا درباره آماره‌های یک جامعه
- ۲. هر حدس درباره میانگین یا نسبت
- ۳. هر حکم درباره پارامتر یک جامعه
- ۴. هر حکم، حکم یا ادعا درباره نمونه‌های یک جامعه

سوال ۱: یک

20.ir

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۲۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: کاربرد آمار و احتمالات در برنامه ریزی شهری

رشته تحصیلی/ گذ درس: جغرافیا و برنامه ریزی شهری (جدید) ۱۲۱۶۴۳۸

۱۵- برای مقایسه میانگین های دو جامعه نرمال اطلاعات زیر بدست آمده است.

۱/۲ ۰/۸ ۰/۶ ۱/۱ ۱/۲ ۰/۹ ۱/۵ ۰/۹ ۱

برآورد میانگین جامعه برابر با:

۴/۰۴ . ۴ ۳/۰۳ . ۳ ۲/۰۲ . ۲ ۱/۰۲ . ۱

۱۶- اگر α احتمال ارتکاب خطای نوع اول باشد، آنگاه α برابر با:۱. [فرض درست است | رد فرض صفر] P ۲. [فرض نادرست است | رد فرض صفر] P ۳. [رد فرض H_0] P ۴. [قبول فرض H_0] P

۱۷- برای تحقیق در مورد ادعای یک متخصص که نسبت در یک جامعه حداقل ۶۵ درصد است، نمونه ای به حجم ۲۰۰ به تصادف انتخاب و می بینیم ۱۱۵ نفر دارای ویژگی مورد نظر را دارند. ادعای این متخصص در چه سطحی تایید می شود؟

$$Z_{0/025} = 1.96, Z_{0/05} = 1.64, Z_{0/01} = 2.33$$

۱. ۹۰ درصد ۲. ۹۵ درصد ۳. ۹۹ درصد ۴. ادعا تایید نمی شود

۱۸- برای مقایسه میانگین های دو جامعه اطلاعات زیر بدست آمده است.

واریانس نمونه	حجم نمونه	جامعه	
		اول	دوم
۳	۱۱		
۴/۵	۲۱		

واریانس نمونه های ادغام شده برابر با:

۱. ۴ ۲. ۳ ۳. ۲ ۴. ۱

۱۹- تعداد تماسهای تلفنی وزارت خانه ای از توزیع نرمال پیروی می کند تعداد تماسها در طول روز بحسب ۱۰۰ مورد به صورت زیر داده شده است.

					تعداد
۴	۳	۲	۱	۰	
۱	۵	۶	۳	۵	فراآنی

مقدار \hat{r} را برابر با:

۱/۹۸ . ۴ ۱/۲۵ . ۳ ۱ . ۲ ۱/۷ . ۱

کارشناسی

حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: کاربرد آمار و احتمالات در برنامه ریزی شهری

رشته تحصیلی/گد درس: جغرافیا و برنامه ریزی شهری (جدید) ۱۲۱۶۴۳۸

سوال ۱: یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۲۰ تشریحی: ۰

۲۰- در بررسی اثر ارتفاع بر میزان بارش، پنج نقطه از سه ارتفاع مختلف از سطح زمین انتخاب و میزان بارش آنها اندازه گیری،

$$F_{0/01} = 6/9^3, F_{0/05} = 3/8^9$$

جدول تحلیل واریانس به شکل زیر بدست آمده است. نتیجه آزمون فرض چیست؟

منابع تغییرات	مجموع مربعات	درجه های آزادی	میانگین مربعات
تیمارها	۲۷,۶۳۴	۲	۱۳,۸۱۷
خطا	۴۸,۰۲۶	۱۲	۴,۰۰۲
جمع	۷۵,۶۶۰	۱۵	

۱. فرض صفر در سطح ۰/۰۵ رد می شود

۲. فرض مقابله در سطح ۰/۰۱ تایید می شود

۳. فرض صفر در سطح ۰/۰۱ رد می شود

۲۱- در مطالعات جغرافیایی میزان رواناب و میزان بارش دارای چه نوع همبستگی هستند؟

۱. همبستگی مستقیم کامل ($r = 1$)۲. همبستگی معکوس کامل ($r = -1$)۲۲- اگر میانگین مقدار آب داده شده به محصول ۲۵ سانتیمتر مربع و میانگین مقدار محصول تولید شده ۵ تن در هکتار باشد، با ضریب $b = ۰/۱۵$ به ازای $a = ۳۰$ سانتیمتر مربع آبیاری چقدر محصول خواهیم داشت؟

۱. ۵/۱۵

۲. ۵/۵

۳. ۵/۶۵

۴. ۵/۷۵

۲۳- مدل خط برآش مقدار محصول گندم (y) و مقدار بارش (x) به صورت زیر داده شده است.

$$y'_i = 1/5 + 0/7x_i$$

برای چه مقداری بارش میزان محصول گندم برابر با $8/5$ خواهد بود؟

۱. ۱۵

۲. ۱۰

۳. ۲۰

۴. ۲۵

۵. ۱

۲۴- کدام یک از آزمونهای زیر جزو آزمون ناپارامتری نیست؟

۱. آزمون میانگین جامعه نرمال

۲. آزمون میانه

۳. آزمون تفاضل دو میانه

۴. ضریب همبستگی رتبه ای

کارشناسی

حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: کاربرد آمار و احتمالات در برنامه ریزی شهری

وشته تحصیلی/ گذ درس: جغرافیا و برنامه ریزی شهری (جدید) ۱۲۱۶۴۳۸

سوال ۱: یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۲۰ تشریحی: ۰

۲۵- توزیع F به چند پارامتر به عنوان درجه های آزادی بستگی دارد؟

۲. دو پارامتر

۱. یک پارامتر

۴. به پارامتری بستگی ندارد

۳. سه پارامتر

۲۶- اگر متغیر تصادفی B مقدار مثبت مشاهدات از میانه جامعه باشد آنگاه B دارای چه توزیعی است.

۴. دو جمله ای

F. ۳

۲. پواسن

۱. نرمال

۲۷- برای آزمون تفاصل دو میانه، نمونه ای به حجم $n_1 = 10$ از جامعه اول و نمونه ای به حجم $n_2 = 9$ از جامعه دوم انتخاب می کنیم. اگر R مجموع رتبه ها کوچکتر باشد ($E(R)$ برابر با:

۱۸۰. ۴

۱۷۰. ۳

۱۵۰. ۲

۱۰۰. ۱

۲۸- روشهای ناپارامتری در چه زمانی مورد استفاده قرار می گیرد؟

۲. میانه توزیع مورد آزمون قرار گیرد

۱. داده ها در مقیاس فاصله ای باشند

۴. روشهای ساده مورد نظر باشد

۳. توزیع جامعه نامعلوم باشد

۲۹- برای مقایسه نسبت کشاورزانی که از آلات کشاورزی در دو ناحیه استفاده می کند اطلاعات زیر بدست آمده است.

کشاورزی	تعداد کشاورزان استفاده کننده از آلات		جامعه
	حجم نمونه	حجم	
۱۵۲	۲۰۰	۲۰۰	اول
۱۳۲	۲۰۰	۲۰۰	دوم

مقدار $\hat{\theta}$ برابر با:

۰/۴۱. ۴

۰/۷۱. ۳

۰/۶۱. ۲

۰/۵۱. ۱

۳۰- اگر $r = 1$ یا $r = -1$ باشد، بین مقادیر X و Y چه نوع همبستگی وجود دارد؟

۲. همبستگی خطی ناقص

۱. همبستگی خطی معکوس

۴. همبستگی وجود ندارد

۳. همبستگی خطی کامل

کارشناسی

حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: کاربرد آمار و احتمالات در برنامه ریزی شهری

رشته تحصیلی/گذ درس: جغرافیا و برنامه ریزی شهری (جدید) ۱۴۰۶۴۳۸

سوال ۱: یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۲۰ تشریحی: ۰

فرمول های پیوست:

$$f(x) = p(X=x) = \binom{n}{r} = p^x (1-p)^{n-x}$$

$$Z = \frac{x - \bar{x}}{s}$$

$$k = 1 + 3/3 \log n$$

$$n = 2^k$$

$$a_i = 360 f_i$$

$$\bar{x} = \frac{\sum xi}{n}$$

$$\bar{x} = \frac{\sum fimi}{n}$$

$$\tilde{x} = L_i + \frac{j}{f_i} \times c$$

$$x_H = \frac{n}{\sum \frac{1}{xi}}$$

$$x_H = \frac{n}{\sum f_i \frac{1}{m_i}}$$

$$x_G = \sqrt{x_1, x_2, \dots, x_n}$$

$$x_G = (x_1, x_2, \dots, x_n)^{\frac{1}{n}}$$

$$\log x_G = \frac{1}{n} \sum f_i \log m_i$$

$$S^2 = \frac{\sum (xi - \bar{x})^2}{n-1}$$

$$S = \sqrt{\frac{n(\sum xi^2) - (\sum xi)^2}{n(n-1)}}$$

$$S = \sqrt{\frac{\sum (xi - \bar{x})^2 f_i}{n-1}}$$

$$Q_1 = L'_i + \frac{m}{f_i} \times C$$

$$S^2 = \frac{n \sum (m_i^2 f_i) - (\sum m_i f_i)^2}{n(n-1)}$$

$$Q_3 = L_j + \frac{\bar{L}}{f_j} \times C$$

$$\bar{x} = m + \frac{\sum Uifi}{n} \cdot C$$

$$\frac{Q_3 - Q_1}{Q_3 + Q_1} \times 100$$

کارشناسی

حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است

 تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰
 زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۲۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: کاربرد آمار و احتمالات در برنامه ریزی شهری

رشته تحصیلی/گد درس: جغرافیا و برنامه ریزی شهری (جدید) ۱۲۱۶۴۳۸

سوال ۱: یک

$$SK = \frac{3(\bar{x} - \tilde{x})}{S}$$

$$\bar{x}_c = \frac{\sum P_i x_i}{\sum P_i}$$

$$\sum \sqrt{(x_i - x_m)^2 + (y_i - y_m)^2}$$

$$\bar{x}_y = \frac{\sum p_i y_i}{\sum p_i}$$

$$S_D = \sqrt{\left(\frac{\sum x_i^2}{N} - x_c^2\right) + \left(\frac{\sum y_i^2}{N} - y_c^2\right)} , \quad \hat{b} = \frac{\sum x_i y_i - n \bar{x} \bar{y}}{\sum x_i^2 - n \bar{x}^2}$$

$$r = \frac{\sum x_i y_i - \frac{\sum x_i \sum y_i}{n}}{\sqrt{\left(\sum x_i^2 - \frac{\left(\sum x_i\right)^2}{n}\right)} \sqrt{\sum y_i^2 - \frac{\left(\sum y_i\right)^2}{n}}} \quad y = ax + b$$