

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

و شته تحصیلی / کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱

۱- اختلال ادواری خوبی حالت خفیف تر کدام اختلال می باشد؟

۲. اختلال دو قطبی

۱. اختلال افسردگی اساسی

۴. اختلال یک قطبی

۳. اختلال SAD

۲- چرا شیوع میزان افسردگی بین زنان بیشتر از مردان است؟ (از دیدگاه روانشنختی)

۱. زنان مسئولیت زیادی بر عهده می گیرند.

۲. عزت نفس پائین دارند.

۳. مردان بیشتر از زنان توانایی رد افکار منفی را دارند.

۴. زنان، شکست هایشان را به ویژگی های شخصی خود نسبت می دهند.

۳- کدام یک از خطاهای منطقی زیر به نتیجه گیری های منفی کلی درباره توانایی یا عملکرد بر حسب یک مورد گفته می شود؟

۴. استنباط دلخواه

۳. شخصی سازی

۲. تعییم مفرط

۱. انتزاع گزینشی

۴- خودکشی در افراد دارای اسکیزوفرنی بیشتر در نتیجه چیست؟

۴. ناآرامی درونی

۳. یأس و نالمیدی

۲. هذیان و توهمند

۱. داروهای مصرفی

۵- براساس DSM-IV-TR اختلال عاطفی فصلی در چه مدتی قابل تشخیص می باشد؟

۱. در چند سال متوالی دوره های افسردگی مشاهده شود.

۲. در فاصله های زمانی مشخص افسردگی اساسی مشاهده شود.

۳. در فاصله های زمانی مشخص افسردگی مضاعف مشاهده شود.

۴. به مدت دو ماه افسردگی اساسی وجود داشته باشد.

۶- طبق مدل شناختی، چه عواملی موجب دوره هایی از افسردگی و مانی (اختلال دو قطبی) می شوند؟

۲. اضطراب بالا و طرحواره

۱. عزت نفس و اعتماد به نفس بالا

۴. توهمندی ها و هذیان ها

۳. معیارهای غیر واقع گرایانه در مورد موقفيت

۷- کدام نوع اسکیزوفرنی با شروع آرام و پیش آگهی بد مشخص می گردد؟

۴. آشفته

۳. باقی مانده

۲. اسکیزوفرنی مزمن

۱. اسکیزوفرنی حاد

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

وشته تحصیلی/ کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱

۸- میزان کلی خودکشی در اسکیزوفرنیا چند درصد است؟

۱. ۲ تا ۱۰ درصد      ۲. ۱۰ تا ۱/۵ درصد      ۳. ۱۰ الی ۷۰ درصد      ۴. ۱ الی ۴ درصد

۹- طبق مطالعات کدام جمله در مورد بیماران اسکیزوفرنی که دارای نمرات بالایی در نشانه های منفی بودند، صحیح است؟

۱. کاهش حجم ماده سفید مغز  
۲. ضخیم تر بودن جسم پینه ای  
۳. کوچکتر بودن گیروس استریت  
۴. افزایش حجم ماده سفید مغز

۱۰- کدام یک از جملات زیر صحیح است؟

۱. آسیب عصبی در اسکیزوفرنیا ناشی از بیماریهای ویروسی که در بهار بیشتر شایع هستند.  
۲. خردسالان دارای عفونت های ویروسی پنج برابر بیشتر از آنها ای که قادر عفونت بودند، به اسکیزوفرنیا مبتلا می شوند.  
۳. کودکان متولد شده در ماه های تابستان نسبت به کودکان متولد شده در زمستان بیشتر در معرض ابتلا به اسکیزوفرنیا هستند.  
۴. جنین های مذکوری که ۵ ماه قبل از تولد در معرض آنفلوانزای ویروسی بودند خطر ابتلا به اسکیزوفرنی بیشتر بود.

۱۱- چالش کلامی و آزمون فرضیه رفتاری جزء کدام یک از رویکردهای روانشناسی برای اسکیزوفرنی است؟

۱. تغییر باورها  
۲. مداخلات خانوادگی  
۳. درمان شناختی رفتاری  
۴. روان تحلیلگرانه

۱۲- نظریه دوسوکور که می گوید برخی والدین غالباً با کودکان خود به شیوه های متضاد برخورد می کنند مربوط به چه کسی است؟

۱. اشتایدر      ۲. فروم ریچمن      ۳. باستون و همکاران      ۴. ایتون و همکاران

۱۳- یک الگوی پایدار از تجربه و رفتار درونی که به طور قابل ملاحظه ای از انتظارات فرهنگی فرد، حداقل در دو مورد از موارد شناخت، خلق، کارکردهای بین فردی یا کنترل تکانه انحراف داشته باشد، کدام گزینه ذیل است؟

۱. شخصیت      ۲. اختلالات شخصیت      ۳. اختلالات خلقوی      ۴. تعارض فرهنگی

۱۴- کدام یک از اختلالات شخصیت در بین زنان شایع است؟

۱. ضداجتماعی و خودشیفته  
۲. دوری گرین و مرزی  
۳. مرزی و خودشیفته  
۴. شخصیت نمایشی و مرزی

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

وشته تحصیلی/ کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ -، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ -، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱

۱۵- مقاومت در پذیرش اطلاعات و شواهدی است که در جریان تحریف های شناختی و الگوهای رفتاری خودشکن، موجب عدم تأیید طرحواره میشوند، توضیح کدام گزینه ذیل است؟

۱. طرحواره      ۲. حفظ طرحواره      ۳. اجتناب از طرحواره      ۴. جبران طرحواره

۱۶- کدام مکانیسم دفاعی بیشتر در اختلال شخصیت پارانوئید استفاده می شود؟

۱. بازگشت      ۲. فرافکنی      ۳. تجزیه      ۴. واپس زدن

۱۷- افکار خرافی، تفکر سحرآمیز، عقاید انتساب، اشتباه حسی و مسخ واقعیت قسمتی از دنیای روزمره افراد مبتلا به کدام اختلال شخصیت زیر است؟

۱. اختلال شخصیت اسکیزوئید      ۲. اختلال شخصیت نمایشی  
۳. اختلال شخصیت اسکیزوتاپال      ۴. اختلال شخصیت پارانوئید

۱۸- کدام گزینه در مورد نتایج تحقیق لوپز و ایمر صحیح است؟

۱. نوجوانان دارای رفتار ضداجتماعی پرخاشگری را پاسخی مناسب در برابر تهدید می دانند.  
۲. افراد مبتلا به اختلال شخصیت ضداجتماعی در آزمون های مهارت های پره فرونتال عملکرد پایین تر داشتند.  
۳. حجم ماده خاکستری مغز نوجوانان مبتلا به اختلال شخصیت ضداجتماعی ۱۱ درصد کاهش نشان می دهد.  
۴. افراد مبتلا به رفتار ضداجتماعی در خانواده از هم گسیخته، والد مجرم و گستردگی خانواده زندگی می کنند.

۱۹- میزان شیوع بی اشتهایی روانی به ترتیب در جمعیت عمومی و در بین زنان جوان چند درصد است؟

۱. ۱۰/۰ درصد و ۱۰/۰ درصد      ۲. ۰/۱ درصد و ۰/۰ درصد  
۳. ۱ درصد و ۲ درصد      ۴. ۱۶ درصد و ۲۱ درصد

۲۰- کدام گزینه در مورد تبیین روان تحلیلگری اختلالات تغذیه ای صحیح است؟

۱. مبتلایان به پراشتها روانی بر فراخود کنترل دارند.  
۲. مبتلایان به بی اشتهایی روانی قدرت الگوی بیشتری دارند.  
۳. ثبیت در مرحله مقدی صورت می گیرد.  
۴. از طریق اعمال خود انضباطی غیرعادی است که بیمار بی اشتها احساس خودمختاری می کند.

۲۱- درمان روان تحلیلگری بیماران مبتلا به پراشتها روانی عینی سازی کدام مکانیسم دفاعی است؟

۱. تجربه و واپس زدن      ۲. درون فکنی و برون فکنی  
۳. برگشت و ابطال سازی      ۴. واپس زدن و برون فکنی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

وشته تحصیلی/ کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۰۹۸ -، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ -، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱

- ۲۲- بر طبق آمار، نیمی از بیماران که به طور معمول تحت درمان چاقی قرار میگیرند دچار چه عارضهای هستند؟

۱. افسردگی و اضطراب خفیف

۲. وسواس- جبری

۳. مصرف مواد

- ۲۳- دو مین تکلیف خانواده درمانی راسل و همکاران کدام یک از موارد زیر می باشد؟

۱. ایجاد تغییراتی در کل سیستم خانواده

۲. درگیر ساختن خانواده در درمان

۳. تعذیه مجدد

- ۲۴- کودکانی که دچار شب ادراری و یا راه رفتن در حین خواب هستند معمولاً در کدام مرحله خواب این اعمال انجام می شود؟

۱. مرحله اول

۲. مرحله دوم و چهارم

۳. مرحله اول و چهارم

۴. مرحله سوم و چهارم

۴. مرحله سوم و چهارم

- ۲۵- کدام اختلال به عنوان داشتن نشانه های بی خوابی اولیه حداقل ۳ شب در هفته به مدت بیش از یک ماه تعریف شده است؟

۱. بی خوابی اولیه

۲. بی خوابی حاد

۳. بی خوابی مزمن

۴. بی خوابی اولیه

- ۲۶- برای درمان کدام اختلال خواب بررسی وضعیت زندگی و خانوادگی فرد دارای اهمیت است؟

۱. اختلال کابوس

۲. وحشت شبانه و خواب گردنی

۳. آپنه

۴. نارکولپسی

- ۲۷- درمان کدام اختلال خواب از مشکل ترین مسائل در اختلالات خواب است؟

۱. بی خوابی اولیه

۲. نارکولپسی

۳. دیس سومنیها

۴. حمله خواب

۴. حمله خواب

- ۲۸- رؤیاهای معمولاً طولانی که موجب اضطراب و ترس شدید می گردد در کدام یک از گزینه زیر حادث می شوند؟

۱. اختلال وحشت شبانه

۲. کابوس

۳. خوابگردی

۴. حرف زدن در خواب

- ۲۹- اصلی ترین ملاک تشخیص نارکولپسی کدام یک از موارد زیر می باشد؟

۱. حملات غیرقابل مقاومت خواب در طول روز

۲. توهمات هپناگوژیک

۳. تجربه کاتاپلکسی (خشکزدگی)

۴. حملات قابل کنترل در طول روز

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

وشته تحصیلی/ کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۰۹۸ -، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ -، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱

۳۰- به تمایلات، رفتارها یا تخیلات جنسی شدید و تکراری در واکنش به اشیاء و موقعیت‌ها چه گفته می‌شود؟

۱. اختلالهای جنسی      ۲. پارافیلیاها  
۳. بدکارکردی جنسی      ۴. اختلال میل جنسی

۳۱- شیوع اختلال نعوظی در کدام گروه سنی از همه بیشتر است؟

۱. ۳۰ الی ۳۹ سالگی      ۲. ۱۸ الی ۲۹ سالگی  
۳. ۴۰ الی ۴۹ سالگی      ۴. ۵۰ الی ۵۹ سالگی

۳۲- داروی سیلدنافیل معروف به ویاگرا مهمترین داروی درمانی کدام اختلال است؟

۱. یادگارخواهی      ۲. اختلال نعوظی  
۳. پارافیلیاها      ۴. بیزاری جنسی

۳۳- مرحله اول جراحی اختلال هویت جنسی شامل کدام یک از گزینه‌های زیر می‌باشد؟

۱. تزریق تسترون      ۲. عمل جراحی متمنکز به صفات اولیه  
۳. تزریق هورمون جنس مقابل      ۴. پروژسترون

۳۴- نوجوانان و بزرگسالان مبتلا به GID چه اشتغال ذهنی در مورد جنسیت‌شان دارند؟

۱. از اندازهای جنسی، جنس مقابل متنفرند.  
۲. معتقدند که با یک جنسیت غلط به دنیا آمده‌اند.  
۳. احساس جذابیت نمیکنند.  
۴. به تغییر جنسیت عمل جراحی فکر می‌کنند.

۳۵- به آسیب دیدن توانایی‌ها برای انجام اعمال (هدفمند) علیرغم سالم بودن کارکردهای حرکتی چه می‌گویند؟

۱. آگنوزیا      ۲. آپراکسی  
۳. آزاییمرو      ۴. پارکینسون

۳۶- در کدام مرحله دمانس فرد به طور عجیب و غریب رفتار می‌کند و اطرافیان به این فکر می‌افتنند که باید مشکلی وجود داشته باشد؟

۱. دمانس مبهم      ۲. دمانس خفیف  
۳. دمانس متوسط      ۴. دمانس شدید

۳۷- مصرف کدام یک از ویتامین‌های زیر در ابتلا به بیماری آلزایمر جلوگیری می‌کند؟

۱. ویتامین A      ۲. ویتامین D  
۳. ویتامین E      ۴. ویتامین B<sub>6</sub> و B<sub>12</sub>

۳۸- در این روش افراد مسنی که دارای سردرگمی در تشخیص مکان، زمان و شخص هستند، با فراهم شدن اطلاعات مناسب به فهم صحیح آنان در مورد جهان کمک می‌شود؟

۱. رویکرد روانشناسی      ۲. تشخیص موقعیت واقعی  
۳. رویکرد زیستی      ۴. رویکرد روان تحلیلی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/ کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱

- ۳۹- در بهبود کارکردهای اجرایی برانسفورد و استاین در مهارت حل مسئله، حرف "L" مربوط به کدام گزینه می باشد؟

۲. مواجه با مسئله

۱. تعریف مسئله

۴. عمل براساس طرح انتخابی

۳. وارسی اثرمندی طرح انتخابی

- ۴۰- سطح استیل کولین، با بالا رفتن سن مخصوصاً در مبتلایان به آلزایمر چه تغییری می کند؟

۴. تغییر نمی کند.

۲. کاهش می یابد.

۱. افزایش می یابد.

۳. اصلاً ترشح نمی شود.