

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۷۰: تشریحی: ۵۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵: تشریحی: ۴

**عنوان درس:** جبر خطی، مبانی ماتریس ها و جبر خطی  
وشته تحصیلی / گد درس: ریاضی محض (ارشد)، ریاضی (محض)، مهندسی صنایع ۱۱۱۰۴۰ - آمار و کاربردها، ریاضیات و کاربردها  
علوم کامپیوتر ۱۱۱۱۳۲۰

استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است

۱- یک دستگاه همگن از معادلات خطی که در آن تعداد متغیرها بیشتر از تعداد معادلات است دارای .....

۱. تعداد بسیاری جواب است.  
۲. جواب نیست.  
۳. یک جواب است.  
۴. جواب صفر است.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{اگر ماتریس} \quad A^4 \quad \text{باشد، آنگاه}$$

$$\begin{bmatrix} 6 & 10 \\ -5 & 11 \end{bmatrix} \quad .4 \quad \begin{bmatrix} 11 & -10 \\ -5 & 6 \end{bmatrix} \quad .3 \quad \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} \quad .2 \quad \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} \quad .1$$

۳- ماتریس مربعی  $A$  را پوچ توان گوییم هرگاه عدد صحیح مثبت  $t$  وجود داشته باشد به طوری که:

$$A^t = A^2 \quad .4 \quad A^t = A \quad .3 \quad A^t = I \quad .2 \quad A^t = 0 \quad .1$$

۴- فرض کنید  $A$  و  $B$  دو ماتریس و  $c$  یک اسکالر باشد، کدام یک از گزینه های زیر نادرست است؟

$$(AB)^t = A^t B^t \quad .2 \quad (A+B)^t = A^t + B^t \quad .1$$

$$(cA)^t = cA^t \quad .4 \quad (A^t)^t = A \quad .3$$

$$A = \begin{bmatrix} 2+3i & 1-4i \\ 6 & 7i \end{bmatrix} \quad \text{با فرض} \quad A^* \quad \text{ماتریس} \quad A^* \quad \text{برابر است با:}$$

$$\begin{bmatrix} 2-3i & 1+4i \\ 6 & -7i \end{bmatrix} \quad .2 \quad \begin{bmatrix} 2+3i & 2 \\ 1+4i & -7i \end{bmatrix} \quad .1$$

$$\begin{bmatrix} 2-3i & 6 \\ 1+4i & -7i \end{bmatrix} \quad .4 \quad \begin{bmatrix} 2+3i & 1+4i \\ 6 & 7i \end{bmatrix} \quad .3$$

۶- فرض کنید ماتریس  $A$  یک ماتریس  $n \times n$  باشد، در این صورت  $A$  معکوس پذیر است اگر و تنها اگر فرم پلکانی تحویل یافته آن ..... باشد.

۱. ماتریس صفر  
۲. ماتریسی متقارن  
۳. ماتریسی پادمتقارن  
۴. ماتریس  $I_n$

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۷۰ تشریحی: ۵۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۴

**عنوان درس:** جبر خطی، مبانی ماتریس‌ها و جبر خطی  
**وشته تحصیلی/گذ درس:** ریاضی محض (ارشد)، ریاضی (محض)، مهندسی صنایع ۱۱۱۰۴۰ - آمار و کاربردها، ریاضیات و کاربردها، علوم کامپیوتر ۱۱۱۱۳۲۰

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 3 \\ -2 & 5 & -1 \end{bmatrix} \quad \text{دترمینان ماتریس: } -7$$

۵ . ۴

۱۰ . ۳

۶ . ۲

۳ . ۱

-۸ اگر ماتریس  $B$  با جابجایی دو سطر (ستون) متواالی ماتریس  $A$  به دست آمده باشد آنگاه:

$|B| = |A|/2$

$|B| = -|A|$

$|B| = 2|A|$

$|B| = |A|$

-۹ کدام یک از ماتریس‌های زیر معکوس پذیر نیست؟

$\begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 0 \\ -1 & 4 & 0 \end{bmatrix}$

-۱۰ حاصل ضرب نقطه‌ای بردارهای  $v = (3,0,2)$  و  $u = (1,-2,4)$  برابر است با:

۵ . ۴

۱۱ . ۳

۷ . ۲

۱۰ . ۱

-۱۱ زاویه بین بردارهای  $u = (1,0,0)$  و  $v = (1,0,1)$  در  $R^3$  کدام است؟

۴۵°

90°

30°

60°

-۱۲ تبدیل خطی  $T: R^2 \rightarrow R^3$  را به صورت  $T\left(\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} x-y \\ 2y \\ x+3y \end{bmatrix}$  در نظر بگیرید. تصویر بردار  $\begin{bmatrix} 5 \\ -1 \end{bmatrix}$  تحت  $T$  برابر با کدام یک از گزینه‌های زیر است؟

$\begin{bmatrix} 4 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix} 6 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix} 6 \\ -2 \\ 2 \end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۷۰ تشریحی: ۵۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۴

**عنوان درس:** جبر خطی، مبانی ماتریس ها و جبر خطی  
**وشته تحصیلی/گذ درس:** ریاضی محض (ارشد)، ریاضی (محض)، مهندسی صنایع ۱۱۱۰۴۰ - آمار و کاربردها، ریاضیات و کاربردها، علوم کامپیوتر ۱۱۱۱۳۲۰

-۱۳ عملگر  $T: R^2 \rightarrow R^2$  با ضابطه تعریف  $T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = r\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$  نامیده می شود اگر:

$r < 1$

$r = 0$

$r > 1$

$r = 1$

-۱۴ فرض کنید  $V$  یک فضای برداری و  $U$  یک زیرمجموعه ناتهی  $V$  باشد،  $U$  را یک زیرفضای  $V$  می نامیم هرگاه تحت ..... بسته باشد.

۱. جمع و ضرب بردارها      ۲. ضرب اسکالر      ۳. جمع بردارها      ۴. جمع و ضرب بردارها

-۱۵ بردارهای  $v_1, v_2, \dots, v_m$  یک فضای برداری را تولید می کنند هرگاه هر بردار در فضای برداری .....  
 ۱. برابر جمعی از این بردارها باشد  
 ۲. حاصل ضرب این بردارها باشد  
 ۳. ترکیب خطی از این بردارها باشد

-۱۶ مجموعه بردارهای  $\{v_1, v_2, \dots, v_m\}$  را مستقل خطی گوییم هرگاه از  $c_1v_1 + c_2v_2 + \dots + c_mv_m = 0$  نتیجه شود:

$\exists i = 1, \dots, m \quad c_i = v_i \quad .2 \quad \forall i = 1, \dots, m \quad c_i = v_i \quad .1$

$\forall i = 1, \dots, m \quad c_i = 0 \quad .4 \quad \exists i = 1, \dots, m \quad c_i = 0 \quad .3$

-۱۷ مجموعه ای متناهی از بردارها همانند  $\{v_1, v_2, \dots, v_m\}$  را یک پایه فضای برداری  $V$  می نامیم هرگاه

۱. این مجموعه  $V$  را تولید کند و وابسته خطی باشد.  
 ۲. این مجموعه  $V$  را تولید کند.  
 ۳. این مجموعه  $V$  را تولید کند و مستقل خطی باشد.  
 ۴. این مجموعه  $V$  را تولید کند و مستقل خطی باشد.

-۱۸ فرض کنید  $V$  یک فضای برداری با پایه  $m$  عضوی  $\{v_1, v_2, \dots, v_m\}$  باشد. در این صورت هر بردار در  $V$  دارای نمایش

۱. منحصر بفردی به فرم  $c_1v_1 + c_2v_2 + \dots + c_mv_m$  است.  
 ۲. به فرم  $c_1v_1 + c_2v_2 + \dots + c_mv_m$  است.  
 ۳. به فرم  $c_iv_i + c_jv_j$  است.  
 ۴. منحصر بفردی به فرم  $c_iv_i$  است.

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۷۰ تشریحی: ۵۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۴

**عنوان درس:** جبر خطی، مبانی ماتریس‌ها و جبر خطی  
**وشته تحصیلی/گذ درس:** ریاضی محض (ارشد)، ریاضی (محض)، مهندسی صنایع ۱۱۱۰۴۰ - آمار و کاربردها، ریاضیات و کاربردها، علوم کامپیوتر ۱۱۱۱۳۲۰

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 2 & 5 & 8 \end{bmatrix} \quad \text{رتبه ماتریس} \quad -19$$

۴.۴

۱.۳

۲.۲

۳.۱

-۴۰ فاصله نقطه  $x = (4, 1, -7)$  در  $R^3$  از زیر فضای  $W$  که در آن  $(3)$ ,  $proj_W^x = (4, -3, -3)$  برابر است با

 $\sqrt{32}$ 

۶.۳

 $\sqrt{41}$ 

۵.۱

$$A = \begin{bmatrix} -4 & -6 \\ 3 & 5 \end{bmatrix} \quad \text{مقادیر ویژه ماتریس} \quad -21$$

-۲ و ۲.۴

-۱ و ۲.۳

۱.۲ و ۲

۱.۱ و ۱

-۴۱ ماتریس مربعی  $A$  قطري شدنی ناميده می شود هرگاه يك ماتریس  $C$  وجود داشته باشد به طوري که ماتریسي قطري باشد.

$D = CA^{-1}C$

$D = CA^{-1}C^{-1}$

$D = C^{-1}AC$

$D = C^{-1}A^{-1}C$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & \sqrt{2} \\ 0 & 3 & 0 \\ 2\sqrt{2} & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{ریشه های معادله مشخصه ماتریس} \quad -23$$

2,±3 .۴

3,2 .۳

2,±3 .۲

3,±2 .۱

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{بعد هسته تبدیل خطی } T \text{ تعریف شده توسط ماتریس} \quad -24$$

۲.۴

۳. صفر

۳.۲

۱.۱

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۷۰ تشریحی: ۵۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۴

**عنوان درس:** جبر خطی، مبانی ماتریس ها و جبر خطی  
**رشته تحصیلی / گذ درس:** ریاضی محض (ارشد)، ریاضی (محض)، مهندسی صنایع ۱۱۱۰۴۰ - آمار و کاربردها، ریاضیات و کاربردها، علوم کامپیوتر ۱۱۱۱۳۲۰

-۲۵ بردار مختصاتی  $B = \{(1,0,0), (0,\frac{3}{5},\frac{4}{5}), (0,\frac{4}{5},-\frac{3}{5})\}$  برابر  $v = (2,-5,10)$  نسبت به پایه یکه متعامد است با:

$$v_B = \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ -10 \end{bmatrix} .^4$$

$$v_B = \begin{bmatrix} -2 \\ 5 \\ -10 \end{bmatrix} .^3$$

$$v_B = \begin{bmatrix} 2 \\ -10 \\ 5 \end{bmatrix} .^2$$

$$v_B = \begin{bmatrix} -2 \\ -10 \\ 5 \end{bmatrix} .^1$$

### سوالات تشریحی

نمره ۱.۷۵

۱- قضیه نامساوی کوشی-شوارتز را بیان و ثابت کنید.

نمره ۱.۷۵۲- بردار  $v = (3,2,6)$  در  $R^3$  را در نظر بگیرید. فرض کنید  $W$  زیرفضایی از  $R^3$  متشکل از همه بردارهایی به صورت  $(a,b,b)$  باشد. بردار  $v$  را به صورت حاصل جمع برداری در  $W$  و برداری عمود بر  $W$  تجزیه کنید.نمره ۱.۷۵۳- معادله تفاضلی  $a_2 = 1$  با شرط های اولیه  $a_n = 2a_{n-1} + 3a_{n-2}$  و  $a_1 = 0$  را برای  $n = 3,4,5,\dots$  حل کنید.نمره ۱.۷۵۴- الف) ماتریسی را تعیین کنید که از اعمال زیر حاصل شده است. انعکاس نسبت به محور  $X$  ها سپس دوران به

اندازه  $\frac{\pi}{2}$  و بعد انبساط از مضرب ۳.

ب) تصویر نقطه  $\begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix}$  را تحت این دنباله از تبدیلات بیابید.