

تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشریحی: ۵

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

سری سوال: یک ۱

عنوان درس: توپولوژی عمومی

رشته تحصیلی/کد درس: ریاضی (محض)، ریاضی (کاربردی)، ریاضی (ریاضی محض (جبر)، ریاضی محض (هندسه) ۱۱۱۱۰۴۵ - ریاضیات و کاربردها ۱۱۱۱۳۷۰

۱- کدامیک از گزاره های زیر درست است.

۱. اگر مجموعه X متناهی باشد، آنگاه توپولوژی متمم متناهی روی X به توپولوژی ناگسسته تبدیل می شود.
۲. اگر مجموعه X متناهی باشد، آنگاه توپولوژی متمم متناهی روی X به توپولوژی گسسته تبدیل می شود.
۳. اگر مجموعه X متناهی باشد، آنگاه توپولوژی متمم شمارا روی X به توپولوژی ناگسسته تبدیل می شود.
۴. اگر A عضوی از توپولوژی T باشد، آنگاه A بسته در X است.

۲- فرض کنیم A و B زیر مجموعه هایی از فضای X باشند. در اینصورت

۱. $A \subseteq A^\circ$
۲. $(A \cap B)^\circ = A^\circ \cap B^\circ$
۳. A° کوچکترین مجموعه باز مشمول در A است.
۴. $(A \cup B)^\circ \subseteq A^\circ \cup B^\circ$

۳- فرض کنیم A و B زیر مجموعه هایی از فضای X باشند. در اینصورت

۱. $(A \cup B)' = A' \cup B'$
۲. $\bar{A} \subseteq A$
۳. $\partial A \subseteq \partial(A \cup B)$
۴. $A^\circ = \bar{A} \cup \partial A$

۴- کدام گزاره نادرست است.

۱. اگر X فضای گسسته و $Y \subseteq X$ ، آنگاه توپولوژی زیر فضایی در Y نیز توپولوژی گسسته است.

۲. اگر $X = \mathbb{R}$ و $Y = \mathbb{N}$ ، آنگاه توپولوژی زیر فضایی در Y توپولوژی گسسته است.

۳. اگر برای هر $1 \leq i \leq n$ ، E_i زیرمجموعه بسته در X_i باشد، آنگاه $\prod_{i=1}^n E_i$ بسته در $\prod_{i=1}^n X_i$ می باشد.

۴. اگر برای هر $1 \leq i \leq n$ ، A_i زیر فضایی از X_i باشد، آنگاه توپولوژی زیرفضایی $\prod_{i=1}^n A_i$ متفاوت از توپولوژی حاصلضربی روی

$$\prod_{i=1}^n A_i \text{ است.}$$

تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشریحی: ۵

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: توپولوژی عمومی

رشته تحصیلی/کد درس: ریاضی (محض)، ریاضی (کاربردی)، ریاضی (آنالیز)، ریاضی محض (جبر)، ریاضی محض (هندسه) ۱۱۱۱۰۴۵ - ریاضیات و کاربردها ۱۱۱۱۳۷۰

۵- فرض کنیم (X, d) یک فضای متریک و تابع $\bar{d}: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ را با ضابطه $\bar{d}(x, y) = \frac{d(x, y)}{1 + d(x, y)}$ تعریف می کنیم

در اینصورت

۱. d متریک است و همان توپولوژی رابه X القا می کند.
۲. (X, \bar{d}) فضای متریک کراندار است.
۳. (X, \bar{d}) فضای تام است.
۴. الف وب درست است.

۶- فرض کنیم $f: X \rightarrow Y$ تابع پیوسته ای باشد آنگاه

۱. تصویر هر مجموعه باز در X ، باز در Y است.
۲. تصویر وارون هر مجموعه باز در Y ، باز در X است.
۳. تصویر هر مجموعه بسته در X ، بسته در Y است.
۴. تصویر وارون هر مجموعه فشرده در Y ، فشرده در X است.

۷- کدام گزاره نادرست است.

۱. اگر X فضای گسسته و $f: X \rightarrow Y$ تابع دلخواهی باشد، آنگاه f پیوسته است.
۲. اگر Y فضای ناگسسته و $f: X \rightarrow Y$ تابع دلخواهی باشد، آنگاه f پیوسته است.
۳. $f: X \rightarrow Y$ پیوسته است اگر و تنها اگر هر زیرمجموعه A از X ، $f(\bar{A}) \subseteq \overline{f(A)}$.
۴. تابع $f: X \rightarrow Y$ باز است اگر و تنها اگر بسته باشد.

۸- فرض کنیم X مجموعه ای و τ توپولوژی متمم متناهی در X باشد، در اینصورت

۱. X فشرده است.
۲. X کامل است.
۳. τ توپولوژی گسسته بر X است.
۴. هر تابع تعریف شده بر X پیوسته است.

۹- فرض کنیم X و Y دو فضا و $f: X \rightarrow Y$ تابع پیوسته باشد. در اینصورت

۱. اگر A زیر مجموعه فشرده X باشد، آنگاه $f(A)$ نیز فشرده است.
۲. اگر A زیر مجموعه همبند X باشد، آنگاه $f(A)$ نیز همبند است.
۳. گزاره ۱ و ۲ برقرار است.
۴. تصویر وارون هر زیرمجموعه همبند در Y همبند در X است.

تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشریحی: ۵

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: توپولوژی عمومی

رشته تحصیلی/کد درس: ریاضی (محض)، ریاضی (کاربردی)، ریاضی (ریاضی محض (جبر)، ریاضی محض (هندسه) ۱۱۱۱۰۴۵ - ریاضیات و کاربردها ۱۱۱۱۳۷۰

۱۰- فرض کنیم (X, d) فضای متری فشرده باشد، در اینصورت

۱. هر زیرمجموعه نامتناهی X دارای یک نقطه انباشتگی است.
۲. X کامل نیست.
۳. X کلا کراندار نیست.
۴. X کراندار نیست.

۱۱- فرض کنیم (X, d) فضای متری و A زیرمجموعه فشرده ای از X و B زیرمجموعه بسته در X باشد بطوریکه $A \cap B = \emptyset$ در اینصورت

۱. $d(A, B) = 0$
۲. $d(A, B) \geq 0$
۳. $d(A, B) > 0$
۴. $d(A, B) = d(x, y)$ به ازای $x \in A$ و $y \in B$

۱۲- کدام گزاره نادرست است.

۱. هر فضای ناگسسته همبند است.
۲. اگر فضای X را نتوان بصورت اجتماع دوزیرمجموعه غیرتهی بسته و جدا از هم X نوشت، آنگاه X همبند است.
۳. اگر X همبند باشد آنگاه برای هر زیرمجموعه غیرتهی A از X ، $\partial A = \emptyset$.
۴. Q ناهمبند است.

۱۳- اگر X ناشمارا باشد، آنگاه توپولوژی متمم شمارا در X

۱. همبند است
۲. فشرده است
۳. متناهی است
۴. همان توپولوژی گسسته در X است

۱۴- فرض کنیم X یک فضا و (A, B) یک جداسازی X باشد. در اینصورت هرگاه Y یک زیرمجموعه همبند X باشد آنگاه

۱. $Y = A$
۲. $Y = B$
۳. $Y \subseteq A$ یا $B \subseteq Y$
۴. $Y \subseteq A$ یا $Y \subseteq B$

۱۵- فرض کنیم X و Y دو فضای همبند باشند، آنگاه

۱. $X \times Y$ همبند است
۲. $X \times Y$ همبند نیست
۳. $X \times Y$ کامل است
۴. $X \times Y$ فشرده است

تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشریحی: ۵

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: توپولوژی عمومی

رشته تحصیلی/کد درس: ریاضی (محض)، ریاضی (کاربردی)، ریاضی (ریاضی محض (جبر)، ریاضی محض (هندسه) ۱۱۱۱۰۴۵ - ریاضیات و کاربردها ۱۱۱۳۷۰

۱۶- کدام گزینه درست است.

۰۱. R ناهمبند است
 ۰۲. هر مجموعه باز در R همبند است
 ۰۳. هر بازه در R همبند است
 ۰۴. R^n ناهمبند است

۱۷- فرض کنیم (X, d) یک فضای متری باشد، همچنین فرض کنیم X فشرده باشد، در اینصورت

۰۱. هر دنباله در X همگرا است
 ۰۲. هر دنباله در X دارای زیردنباله ای کراندار است
 ۰۳. هر دنباله در X دارای زیردنباله ای همگراست
 ۰۴. گزاره ۲ و ۳ درست است

۱۸- فرض کنیم $\{A_i\}_{i \in I}$ خانواده ای از زیرمجموعه های فضای توپولوژیک (X, τ) باشد. در اینصورت

۰۱. $\bigcap_{i \in I} \overline{A_i} \subseteq \overline{\bigcap_{i \in I} A_i}$
 ۰۲. $\bigcup_{i \in I} (A_i)^\circ \subseteq (\bigcup_{i \in I} A_i)^\circ$
 ۰۳. $\bigcap A_i \subseteq (\bigcap_{i \in I} A_i)^\circ$
 ۰۴. $(\bigcup_{i \in I} A_i)' \subseteq \bigcup_{i \in I} A_i'$

۱۹- فرض کنیم (X, τ) فضای توپولوژیک و $A \subseteq X$ ، در اینصورت

۰۱. A باز است اگر و تنها اگر $A \cap \partial A = \emptyset$
 ۰۲. $A \subseteq \partial A$ اگر و تنها اگر A بسته است
 ۰۳. A هم باز و هم بسته است، اگر و تنها اگر $\partial A = \emptyset$
 ۰۴. $A \subseteq A'$ اگر و تنها اگر A بسته است

۲۰- فرض کنیم X مجموعه ای با n عضو باشد. در اینصورت

۰۱. حداقل 2^{2^n} توپولوژی متمایز در X موجود است.
 ۰۲. حداکثر 2^{2^n} توپولوژی متمایز در X موجود است.
 ۰۳. حداکثر $2^{2^n - 2}$ توپولوژی متمایز در X موجود است.
 ۰۴. حداقل $2^{2^n - 2}$ توپولوژی متمایز در X موجود است.

سوالات تشریحی

۱- فرض کنیم A زیرمجموعه ای از فضای X باشد بطوریکه $\overline{A} = X$. در اینصورت اگر U در X باز باشد، آنگاه

$$\overline{U} = \overline{U \cap A}$$

۲- فرض کنیم $X = R^m$ ، d و ρ مترهای اقلیدسی و مربعی باشند در اینصورت توپولوژی متری در X که به وسیله d و ρ القا میشوند یکسانند.

۳- فرض کنیم X یک فضای هاسدورف و Y زیرمجموعه ای فشرده از آن باشد. در اینصورت هرگاه
 $X - Y$ آنگاه دو مجموعه باز جدا از هم مانند U و V وجود دارد که $x \in U$ و $x \in V$.

تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشریحی: ۵

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: توپولوژی عمومی

رشته تحصیلی/کد درس: ریاضی (محض)، ریاضی (کاربردی)، ریاضی (آنالیز)، ریاضی (محض (جبر)، ریاضی (محض (هندسه) ۱۱۱۱۰۴۵ - ریاضیات و کاربردها ۱۱۱۱۳۷۰

۴- فرض کنیم (X, d) یک فضای متریک و $t \in X$ و $A \subseteq X$ که در آن $A \neq \emptyset$. ثابت کنید هرگاه A زیر مجموعه فشرده ای از X باشد و $B \subseteq X$ ، آنگاه B عضوی مانند t دارد بطوریکه $d(t, B) = d(A, B)$.

۵- فرض کنیم X یک فضا باشد. در این صورت X همبند است اگر و تنها اگر هر تابع پیوسته مانند $f: X \rightarrow \{0, 1\}$ از X بتوی فضای گسسته $\{0, 1\}$ تابع ثابت باشد.