

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اعتیاد

رشته تحصیلی/ گد درس: علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی) ۱۴۲۲۱۷۰

- بنا بر عقیده کدام فرد، اعتیاد عبارت است از رفتاری که بر اثر عادت برفرد چنان مسلط می شود که کاملاً یا تا حدی، رفتارهای سالم او را تحت تأثیر قرار می دهد؟

۴. شاملو

۳. جلینک

۲. ساراسون

۱. ویکلر

- بر اساس دیدگاه (ج - راو)، حداقل مدت مصرف یک ماده جهت تمایز سوء استفاده یا استفاده مرضی (متداول) آن ماده چقدر است؟

۴. یکسال

۳. شش ماه

۲. دو ماه

۱. یک ماه

- ظهور مقاومت بدنی یا بافتی در مقابل آثار ماده مخدر چه نام دارد؟

۴. سندروم قطع دارو

۳. واپستگی فیزیکی

۲. تحمل

۱. واپستگی روانی

- زادگاه اصلی افیون، کدام کشور است؟

۴. ایران

۳. هند

۲. یونان

۱. مصر

- به گفته روانکاوان، کدام دارو می تواند عقده های سرکوفته بیماران را چاره نماید؟

۴. تریاک

۳. حشیش

۲. کوکائین

۱. ال . اس . دی

- اولین عامل گسترش، رواج و پذیرش مواد مخدر در ایران چه بود؟

۲. اعتیاد اغلب درباریان به مواد مخدر

۱. اعتقاد به تسکین بخش بودن این مواد

۴. بازارفروش، درآمد و سود بیشتر

۳. جلوگیری از رشد آگاهی و قیام بر ضد استعمار

- تاریخچه مصرف الكل به کدام دوره (دوره ها) می رسد؟

۲. دوره قاجاریه

۱. دوره صفویه

۴. از زمان حمله مغول به ایران

۳. دوره های اول عصر حجر

- (آمفتامین ها)، تاثیراتشان در تonus روانی چگونه است؟

۲. تonus روانی را بالا می برند

۱. تonus روانی را پایین می آورند

۴. بر تonus روانی هیچ تأثیری ندارند

۳. تonus روانی را مختل می سازند

- کدام گروه از مواد، ابتدا باعث تحریک و سپس سبب افسردگی می گردند؟

۴. خواب آورها

۳. نشه زاهما

۲. خیال انگیزها

۱. سکرآورها

سری سوال: ۱ یک
زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰
تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰
عنوان درس: اعتیاد
و شته تحصیلی/ گد درس: علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی) ۱۲۲۲۱۷۰
۱۰- نسبت تعداد مردان الکلیک به زنان ، چگونه است؟

۱. تعداد مردان الکلیک سه تا چهار برابر تعداد زنان الکلیک است
۲. تعداد مردان الکلیک یک تا دو برابر تعداد زنان الکلیک است
۳. تعداد مردان الکلیک دو تا سه برابر تعداد زنان الکلیک است
۴. تعداد مردان الکلیک پنج تا شش برابر تعداد زنان الکلیک است

۱۱- حدود چند درصد معتادان به الكل ، دچار حمله الكلی می شوند؟

- | | | | |
|------------|--------------|-------------|------------|
| ۱. یک درصد | ۲. هفده درصد | ۳. پنج درصد | ۴. ده درصد |
|------------|--------------|-------------|------------|

۱۲- کدامیک از علائم نامبرده ، به نشانگاه ورنیک مربوط است؟

- | | |
|--|---|
| ۱. زوال دستگاه مرکزی اعصاب به ویژه مغز میانه | ۲. پرکردن جاهای خالی حافظه با داستانهای تخیلی |
| ۳. نسیان در یادآوری وقایع اخیر | ۴. تورم سلولهای اعصاب محیطی و از دست دادن حس |

۱۳- با چه مقدار از غلظت الكل در خون ، قدرت تفکر ، قضاوت و مهارت ضعیف می شود؟

- | | | | |
|-------------|--------------|--------------|-------------|
| ۱. ۰/۱ درصد | ۲. ۰/۰۵ درصد | ۳. ۰/۰۲ درصد | ۴. ۰/۳ درصد |
|-------------|--------------|--------------|-------------|

۱۴- روش استاندارد تشخیص کالولوئیدهای تربیک و مشتقان آن در ادرار چیست؟

- | | |
|--------------------------------|---|
| ۱. روش کروماتوگرافی | ۲. روش تزریق ماده ایی به نام ان_الیل نورمرفین |
| ۳. روش تشخیص بر اساس DSM_III_R | ۴. روش تزریق نالین به ادرار |

۱۵- تجویز متادون سبب کدام دسته از تغییرات در EEG می گردد؟

۱. افزایش میانگین امواج آلفا و بتا و کاهش میانگین امواج تتا
۲. افزایش میانگین امواج آلفا و تتا و کاهش میانگین امواج بتا
۳. کاهش میانگین امواج آلفا و بتا و افزایش میانگین امواج تتا
۴. کاهش میانگین امواج آلفا و تتا و کاهش میانگین امواج بتا

۱۶- جمله صحیح در ارتباط با مصرف مواد مخدر ، کدام است؟

۱. مصرف کننده هروئین ماهرانه به آزمونهای چالاکی حرکات و مهارتهای فکری پاسخ می دهد
۲. مصرف هروئین سبب پرخاشگری و حالت تهاجمی بالا در فرد می شود
۳. هروئین به اندازه مرفین خواب آور است
۴. قطع اعتیاد به هروئین در میانسالان مشکلتر از جوانان است

سری سوال: ۱ یک
زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰
تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰
عنوان درس: اعتیاد
رشته تحصیلی/ گد درس: علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی) ۱۲۲۲۱۷۰
۱۷- داروی مخدری است که هنگام جنگ جهانی دوم ، در آلمان رواج یافت ،
۴. الكل
۳. متادون
۲. مرفین
۱. هروئین
۱۸- مدت زمان لازم جهت اعتیاد به کوکائین چقدر است ؟
۴. دو تا هشت ماه
۳. پنج تا ده ماه
۲. یک تا شش ماه
۱. سه تا پنج ماه
۱۹- اثر فارماکودینامیک اساسی کوکائین را وقفه در جذب مجدد کدام ماده می دانند ؟
۴. سروتونین
۳. آدرنالین
۲. استیل کولین
۱. دوبامین
۲۰- اثر پارانو، به دلیل مصرف دائم چه ماده ای بروز می کند؟
۴. مرفین
۳. آمفتابین
۲. متادون
۱. هروئین
۲۱- کدامیک از داروهای مخدر نامبرده ، از قارچ به دست می آید ؟
۴. ماری جوانا
۳. مسکالین
۲. پسیلوس بین
۱. ال . اس . دی
۲۲- حشیش به لحاظ خاصیت کیف زایی ، به کدام مشتقات نزدیک است ؟
۴. کافئین
۳. ال . اس . دی
۲. تریاک
۱. آمفتابین
۲۳- نشانه های مسمومیت رفتاری بعد از خوردن چه میزانی کافئین بروز می کند ؟
۲. ۴۰۰ میلی گرم یا بیشتر
۱. ۲۰۰ - ۲۰۰ میلی گرم یا بیشتر
۴. ۱۲۰۰ میلی گرم یا بیشتر
۳. ۶۰۰ - ۷۰۰ میلی گرم یا بیشتر
۲۴- در چه فاصله ای پس از مصرف آخرین سیگار، سندرم ترک نیکوتین شروع می شود ؟
۴. ۴۸ ساعت
۳. ۲۴ ساعت
۲. ۹۰-۱۲۰ دقیقه
۱. ۶۰-۹۰ دقیقه
۲۵- بر اساس دیدگاه کنبرگ ، مناسب ترین گروه جهت درمان کدام است ؟
۲. اسکیزوئید
۱. دپرسیو مازوخیستیک
۴. بارانوئید و ضد اجتماعی
۳. خودشیفتگ
۲۶- از نظر فریمان ، فرد چگونه معناد می شود ؟
۲. زندگی در طبقه اجتماعی پائین
۱. از طریق تماس با فروشنده‌گان مواد مخدر
۴. بدلیل اختلالات شخصیتی و ناهنجاری های روانی
۳. از طریق گروه های غیررسمی و ارتباط با همسالان

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اعتیاد

رشته تحصیلی/ گد درس: علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی) ۱۴۲۲۱۷۰

۲۷- در کدامیک از مراحل اعتیاد، معتاد به فلاکت می افتد؟

- ۱. مرحله ابتدایی
- ۲. مرحله پیشرفته
- ۳. مرحله رها کردن خانه و خانواده
- ۴. مرحله پیشرفت نسبی

۲۸- در کدام روش ترک اعتیاد، فرد در محل خاصی که نتواند به خود یا دیگران صدمه بزند، نگهداری می شود تا به خودی خود پس از چند روز اعتیاد را ترک کند؟

- ۱. ترک تدریجی غیردارویی
- ۲. ترک ناگهانی دارویی
- ۳. ترک ناگهانی غیردارویی
- ۴. متادون

۲۹- کدام دارو از جمله آنتاگونیست های مواد مخدر است؟

- ۱. گلوئینیدین
- ۲. لافکسیدین
- ۳. سیکلазوسین
- ۴. متادون

۳۰- کدام رویکرد، بر باده نوشی مانند پاسخی به فشار روانی تأکید کرده و مراجعان را راهنمایی می کند تا با در نظر گرفتن پیش درآمدها و پیامدهای زیاده روی در باده نوشی، رفتارشان را هدایت کنند؟

- ۱. یادگیری
- ۲. شناختی
- ۳. زیست شناختی
- ۴. روان پویایی