

مجاز است.

استفاده از:

۱. تابع $f(x) = \log \frac{1-x}{1+x}$

- الف. فرد است ب. زوج است ج. نه فرد نه زوج است د. $[-1, 1]$

۲. فرض کنید D_f عبارت از: $g(x) = \sqrt{2-x}$ ، $f(x) = \sqrt{x-1}$ باشند. در اینصورت $\frac{f}{g}$

- الف. $[1, 2]$ ب. $[1, 2]$ ج. $(1, 2)$ د. $(1, +\infty)$

۳. مختصات قطبی نقطه $(-\sqrt{3}, -1)$ برابر است با

- الف. $(2, \frac{\pi}{6})$ ب. $(-2, \frac{4\pi}{3})$ ج. $(-2, \frac{\pi}{6})$ د. $(-2, \frac{\pi}{3})$

۴. معادله دکارتی $r = 2\cos\theta$ برابر است با

الف. $x^2 - y^2 = 4$ ب. $x^2 + y^2 = 2x$

ج. $x^2 + y^2 + 2x = 0$ د. $x^2 + y^2 = 4$

۵. نقطه تلاقی دو منحنی $r = 2 - 2\cos\theta$ ، $r = 2\cos\theta$ عبارت است از ...

- الف. $(0, \frac{\pi}{3})$ ب. $(2, \frac{\pi}{3})$ ج. $(2, \frac{\pi}{6})$ د. $(1, \frac{\pi}{3})$

۶. اگر $z = \frac{(\cos\varphi + i\sin\varphi)^{12}}{(\cos\psi + i\sin\psi)^5}$ آنکاه z برابر است با

- الف. $-\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i$ ب. $-\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}i$ ج. $\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i$ د. $\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}i$

مجاز است.

استفاده از:

۷. یکی از ریشه‌های معادله $z^3 + 8 = 0$ کدام است؟د. $2i$ ج. $i\sqrt{3} + i$ ب. $i\sqrt{3} - i$ الف. $i - \sqrt{3}$ ۸. نمایش هندسی تساوی $|z + 4| = |z - 2|$ اعبارت است ازب. یک خط قائم به معادله $x = -1$ الف. یک خط قائم به معادله $x = 1$ د. یک خط افقی به معادله $y = -1$ ج. یک خط افقی به معادله $y = 1$ ۹. تابع $f(x) = \begin{cases} x^3 - 3x & x \in Q \\ x - 3 & x \in \mathbb{R} - Q \end{cases}$ در چند نقطه پیوسته است؟

د. ۲

ج. بیشمار

ب. صفر

الف. ۳

۱۰. تابع $f(x) = x^3 \left(\frac{x+3}{2} + \frac{x-3}{2} \right)$ در $x = 3$
.....

الف. پیوسته است ب. پیوستگی چپ دارد ج. پیوستگی راست دارد د. پیوستگی راست ندارد

۱۱. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \text{Arc cos}(\sqrt{x^3 + x} - x)$ برابر است باد. $\frac{\pi}{4}$ ج. $\frac{\pi}{6}$ ب. $\frac{\pi}{3}$ الف. $\frac{\pi}{2}$ ۱۲. معادله خط قائم بر منحنی $y = x^3 + 3x - 7$ در نقطه‌ای به طول ۲ کدام است؟د. $y = 7x + 3$ ج. $y = \frac{1}{7}x + \frac{2}{7}$ ب. $y = \frac{-1}{7}(x - 2)$ الف. $y = -7x - \frac{2}{7}$ ۱۳. مشتق $f(x) = \text{tg}(\sin 2x)$ در نقطه $x = 0$ کدام است؟

د. ۳

ج. ۱

ب. ۲

الف. صفر

مجاز است.

استفاده از:

۱۴. مشتق $y = x^{Lx}$ برابر است با

د. $\frac{y}{x} Lx$

ج. $\frac{x}{y} Lx$

ب. $\frac{y}{x} Lx$

الف. $\frac{y}{x} Lx$

۱۵. فرض کنید $f(x) = \begin{cases} -3x + 5 & x \geq 2 \\ x^3 - 5 & x < 2 \end{cases}$ در اینصورت f در نقطه $x = 2$

د. ماکسیمم نسبی دارد

ج. مینیمم دارد

ب. ناپیوسته است

الف. مشتق پذیر است

۱۶. به ازای چه مقادیری از a, b , $y = ax^3 + bx^2 + 4x + 1$ در نقطه $(-1, 1)$ عطف دارد؟

د. $\begin{cases} a = -1 \\ b = 1 \end{cases}$

ج. $\begin{cases} a = 1 \\ b = 3 \end{cases}$

ب. $\begin{cases} a = -1 \\ b = 3 \end{cases}$

الف. $\begin{cases} a = -1 \\ b = -3 \end{cases}$

۱۷. حاصل انتگرال $\int_{-9}^1 \frac{1}{9+x^3} dx$ عبارت است از

د. $\frac{1}{3} \operatorname{arc} \operatorname{tg} \frac{x}{3}$

ج. $3 \operatorname{arc} \operatorname{tg} \frac{x}{3}$

ب. $\operatorname{arc} \operatorname{tg} \frac{x}{3}$

الف. $3 \operatorname{arc} \operatorname{tg} x$

۱۸. اگر تابع f در فاصله $[1, 4]$ پیوسته باشد و داشته باشیم $f(x) \leq \frac{1}{\sqrt{x}}$ در اینصورت:

د. $\int_1^4 f(x) dx \geq 2$

ج. $\int_1^4 f(x) dx \geq 1$

ب. $\int_1^4 f(x) dx \leq 1$

الف. $\int_1^4 f(x) dx \leq 2$

۱۹. انتگرال ناسره $\int_{-1}^8 \frac{1}{\sqrt[3]{x}} dx$ همگرا به چه عددی است:

د. $\frac{15}{2}$

ج. $-\frac{9}{2}$

ب. ۶

الف. $-\frac{3}{2}$

مجاز است.

استفاده از:

$$20. \text{ همگرایی انتگرال ناسره} \int_1^{+\infty} \frac{e^{-\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx \text{ به}$$

د. واگرایست

ج. $\frac{3}{e}$ استب. $\frac{2}{e}$ استالف. $\frac{1}{e}$ است

سوالات تشریحی

۱. منحنی $r = 2 + \cos \theta$ را رسم کنید. (۲ نمره)

$$2. \text{ فرض کنید } A = f'(-4) + f'\left(\frac{1}{2}\right) + f'\left(\frac{5}{2}\right) \text{ باشد. مقدار } f(x) = \begin{cases} [x] + vx & x > 1 \\ L(x^v + \frac{3}{4}) & 0 < x \leq 1 \\ |x^v - x - 6| & x \leq 0 \end{cases} \text{ را بدست آورید.}$$

(۲ نمره)

۳. انتگرال‌های مقابله را بدست آورید. (۳ نمره)

الف. $\int \sec^3 x dx$

ب. $\int \frac{dx}{(1+9x^3)^2}$

۴. با استفاده از روش لایه‌های استوانه‌ای حجم کره‌ای به شعاع r را بدست آورید. (۱/۵ نمره)

۵. طول کمانی از منحنی $y = -\ln(1-x^v)$ را بین $x=0$ و $x=\frac{1}{v}$ بدست آورید. (۱/۵ نمره)