

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشریحی: ۴

دوس: فیزیک پایه ۱

روش تحلیلی/ گد درس: زمین شناسی (محض)، زمین شناسی (کاربردی) ۱۱۱۳۰۸۳

استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است

- کامیونی با سرعت 15 m/s در حرکت است. سنگ کوچکی با سرعت ثابت 5 m/s در جهت قائم از بالای یک پل سقوط می‌کند. هنگامی که کامیون از زیر پل می‌گذرد، سنگ به شیشه کامیون برخورد می‌کند، سنگ با چه سرعت نسبی به شیشه جلوی اتومبیل برخورد می‌کند؟

۱. $10\sqrt{2} \text{ m/s}$

۲. 10 m/s

۳. $5\sqrt{10} \text{ m/s}$

۴. 5 m/s

- عدد $1/55$ داری چند رقم با معنی است؟

۱. ۳

۲. تعداد ارقام با معنی مشخص نیست.

۴. ۱

۵. ۳


- بردارهای A و B مفروض اند. اگر اندازه بردار حاصل جمع این دو بردار با اندازه تفاضل دو بردار برابر باشد، زاویه میان دو بردار فوق چقدر می‌باشد؟ (ابتداً دو بردار بر هم منطبق می‌باشند)

۱. صفر

۲. $\frac{\pi}{6}$

۳. $\frac{\pi}{2}$

۴. $\frac{\pi}{3}$

- شکل زیر منحنی حرکت سه جسم را بر حسب زمان نشان می‌دهد. در لحظه $t = 18 \text{ s}$ سرعت کدام یک بیشتر است؟

۱. A و C

۲. C

۳. B

۴. B

- گلوله‌ای از سطح زمین با سرعت $\frac{m}{s}$ در راستای قائم به طرف بالا پرتاب می‌شود. زمان رسیدن به نقطه اوج و سرعت متوسط آن در مسیرش از نقطه پرتاب تا نقطه اوج به ترتیب چقدرند؟

$$(g = 10 \frac{m}{s^2})$$

۱. $15 \frac{m}{s}, 13s$

۲. $30 \frac{m}{s}, 145s$

۳. $30 \frac{m}{s}, 145s$

۴. $30 \frac{m}{s}, 13s$

تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشریحی: ۴

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

دوس: فیزیک پایه ۱

رشته تحصیلی/ گد درس: زمین شناسی (محض)، زمین شناسی (کاربردی) (۱۱۳۰۸۳)

۶- جرم و شعاع سیاره‌ای نصف جرم و شعاع زمین است.
شتاب گرانش در سطح این سیاره چند برابر شتاب گرانش در سطح زمین است؟

۴.۴

۲.۳

۱.۲

۱.۱

۴

۷- توپی با سرعت اولیه 10 m/s تحت زاویه 60° نسبت به افق به سمت شخصی پرتاب می‌شود، شخص با نقطه پرتاب 20 m فاصله دارد. او (با شروع در لحظه پرتاب) باید با چه سرعتی بود تا بتواند توپ را درست در لحظه‌ای که می‌خواهد به زمین برخورد کند، بگیرد؟ ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

 $22/68 \text{ m/s}^2$ $15/67 \text{ m/s}^2$ $8/66 \text{ m/s}^2$ $13/10 \text{ m/s}^2$

۸- جسمی به جرم 5 کیلوگرم بر روی یک سطح شیب دار بدون اصطکاک با زاویه 30° درجه به پایین می‌لغزد. شتاب حرکت جسم چقدر می‌باشد؟ ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

 1 m/s^2 $8/7 \text{ m/s}^2$ $1/74 \text{ m/s}^2$ 5 m/s^2

۹- شخصی به جرم 60 kg بر روی یک بالابر که با شتاب ثابت و تندشونده 1 m/s^2 به سمت بالا حرکت می‌کند، قرار دارد. نیرویی که بالابر به شخص وارد می‌سازد (عکس العمل سطح) چند نیوتن است؟ ($g = 10 \text{ m/s}^2$)


۶۰

۶۶۰

۵۴۰


۶۰۰

۱۰- میله سبک و محکمی مطابق شکل زیر بر روی تکیه گاه قرار دارد و نیروی 50 N در فاصله 2 m به یک انتهای میله وارد می‌شود. نیروی N در چه فاصله‌ای از تکیه گاه اثر کند تا میله در حالت افقی باقی بماند؟ ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

 $0/25 \text{ m}$ $0/87 \text{ m}$ $0/5 \text{ m}$ $0/43 \text{ m}$

۱۱- مطابق شکل، جسمی به جرم $m = 2 \text{ kg}$ را به اندازه 1 m روی سطح افقی می‌کشیم. ضریب اصطکاک جنبشی $\mu = 0.5$ است.

کار نیروی اصطکاک چند ژول می‌باشد؟ ($g = 10 \text{ m/s}^2, \theta = 30^\circ$)

 $2/5$ $3/8$ 3 1

تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشریحی: ۴


سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

دوس: فیزیک پایه ۱

روش تحصیلی/گد درس: زمین شناسی (محض)، زمین شناسی (کاربردی) ۱۱۱۳۰۸۳

-۱۲ درون حلقه شیارداری به شعاع r که در سطح قائم نگه داشته شده است، گلوله‌ای کوچک می‌تواند بدون اصطکاک حرکت کند. اگر به این گلوله در نقطه A سرعت $v = 2\sqrt{gr}$ (m/s) داده شود، تا چه نقطه‌ای می‌تواند درون شیار بالا رود؟ (B وسط کمان AC و D وسط کمان CE می‌باشند)



D . ۴

B . ۳

C . ۲

E . ۱

-۱۳ کودکی به جرم ۳۵ کیلوگرم در مدت ۷ ثانیه از تپه‌ای به ارتفاع ۴ متر بالا می‌رود. توان تولید شده چند وات است؟

۲۴۵ . ۴

۲۰۰ . ۳

۲۰ . ۲

۱۴۰۰ . ۱

-۱۴ در فضای یک بعدی، اگر ذره m_1 با سرعت u_1 به ذره m_2 که در حالت سکون قرار دارد، سر به سر و به طور الاستیک (کشسان) برخورد کند، در صورتی که $m_1 \neq m_2$ باشد، سرعت ذره اول پس از برخورد چقدر می‌شود؟

۴ . صفر

$$v_1 = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} u_1 \quad .3$$

$$v_1 = \frac{2m_1}{m_1 + m_2} u_1 \quad .2$$

$$v_1 = u_1 \quad .1$$

-۱۵ یک گلوله ۵۰ گرمی با سرعت ۵۰۰ m/s به یک قالب چوبی شلیک می‌شود و با سرعت ۵۰ m/s از طرف دیگر آن بیرون می‌آید. اگر گلوله به مدت ۱s/۰ در داخل قالب در حرکت بوده باشد، چه نیروی متوسطی به آن وارد کرده است؟

۲۱۰ N . ۴

۲۵۰ N . ۳

۲۷۵ N . ۲

۲۲۵ N . ۱

-۱۶ در یک حرکت دورانی با شتاب زاویه‌ای ثابت α ، چه رابطه‌ای میان این شتاب زاویه‌ای و شتاب مماسی a_t و سرعت زاویه‌ای ω برقرار است؟

$$a_t = r\alpha \quad .4$$

$$a_t = \frac{\alpha}{r\omega^2} \quad .3$$

$$a_t = r\omega^2\alpha \quad .2$$

$$a_t = \frac{\alpha}{r} \quad .1$$

-۱۷ در یک حرکت دورانی در سطح قائم، به ترتیب در کدام نقاط؛ کشش نخ و شتاب مماسی بیشترین مقدار را دارند؟

۲. پایین ترین نقطه، بالاترین نقطه

۱. پایین ترین نقطه، بالاترین نقطه

۴. بالاترین نقطه، پایین ترین نقطه

۳. استوای مسیر، بالاترین نقطه

تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشریحی: ۴

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

دوس: فیزیک پایه ۱

رشته تحصیلی/ گد درس: زمین شناسی (محض)، زمین شناسی (کاربردی) ۱۱۱۳۰۸۳

-۱۸ مهره کوچکی را روی لبه صفحه ای به شعاع 10 cm قرار داده ایم. اگر حداقل ضرب اصطکاک بین مهره و صفحه $\frac{1}{2}$ باشد، صفحه حداکثر با چه سرعتی بر حسب متر بر ثانیه می‌تواند بچرخد تا مهره روی صفحه نلغزد. ($g = 10\text{ m/s}^2$)

۱۲.۴

۱۹/۱.۳

۲۷.۲

۰/۱۴۴۱

-۱۹ ماهواره‌ای در یک مدار دایره‌ای به شعاع r دور زمین دوران می‌کند، سرعت مداری ماهواره (v) چه نسبتی با r دارد؟

$$\frac{1}{\sqrt{r}} \cdot ۴$$

$$\frac{1}{r} \cdot ۳$$

$$\sqrt{r} \cdot ۲$$

$$r \cdot ۱$$

-۲۰ در قطب زمین چه رابطه‌ای میان شتاب ثقل (g)، شتاب مرکز گرا (a_r) و شتاب گرانش (g_{gr}) برقرار می‌باشد؟

$$g_{gr} = g - a_r \cdot ۴$$


$$g_{gr} = g \cdot ۳$$

$$g_{gr} = g + a_r \cdot ۲$$

$$g_{gr} = a_r \cdot ۱$$

سوالات تشریحی

۱.۷۵ نمره - با استفاده از نمودار سرعت - زمان جسمی به شکل زیر: (الف) نمودار a بر حسب t ، (ب) نمودار x بر حسب t را رسم کنید (در لحظه ابتدایی جسم در مبدأ مکان قرار دارد) و (ج) شتاب متوسط در ۶ ثانیه اول چقدر است؟



۱.۷۵ نمره - شخصی به جرم 60 کیلوگرم که اسکیت به پا کرده است و با سرعت 10 km/h در حرکت است، به یک سربالایی با شیب 15 درجه می‌رسد. اگر این شخص از این لحظه به بعد هیچ تلاشی برای جلو راندن خودش نکند، چه مسافتی را روی این شیب طی خواهد کرد. (اصطکاک ناچیز است، $\sin 15^\circ = 0.26$ ، $\cos 15^\circ = 0.97$ و $(g = 10\text{ m/s}^2)$

۱.۷۵ نمره - ثابت کنید در برخورد کشسان یک بعدی دو ذره، اندازه سرعت نسبی قبل و بعد از برخورد برابر است ولی از لحظ جهت معکوس می‌شود یعنی $(v_2 - v_1) = -(v_1 - v_2)$ سرعت قبل از برخورد و سرعت بعد از برخورد برای هر ذره می‌باشد). راهنمایی: از خواص برخورد کشسان استفاده نمایید.

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشریحی: ۴

دروس: فیزیک پایه ۱

رشته تحصیلی/گد درس: زمین شناسی (محض)، زمین شناسی (کاربردی) ۱۱۱۳۰۸۳

- ۴- اتومبیلی به جرم ۱۰۰۰ کیلوگرم در جاده‌ای با شیب عرضی ۳۰ درجه مسیری منحنی به شعاع ۵۰ متر را طی می‌کند. اگر ضریب اصطکاک ایستایی $5/0$ باشد، کمترین سرعت مطمئن برای این اتومبیل چقدر است؟ ($g = 10 \text{ m/s}^2$)