

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/ کد درس: روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ -، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۱۰۹۸ -، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۲۴۰ -، روانشناسی ۱۲۱۷۰۶۱ -

۱- بر طبق نتایج پژوهش های برونيش و ويچن ۱۹۹۴ چند درصد افرادی که هیچ اختلال روانی نداشتند تفکراتی در مورد خودکشی نشان دادند؟

۱. ۲ درصد      ۲. ۸ درصد      ۳. ۶۵ درصد      ۴. ۶۹ درصد

۲- کدام دانشمند، احساس گناه، نشانه های هذیانی افسرده وار و ناآرامی درونی و بی قراری را از جمله ویژگی های روانشناسی افرادی می داند که تلاش هایی برای خود کشی دارند؟

۱. ابرامسون      ۲. بک      ۳. دورکیم      ۴. ولفر سدورف

۳- در اواسط دهه ۱۹۸۰ کدام اختلال بوسیله روزنتال و همکارانش مطرح گردید؟

۱. اختلال دو قطبی      ۲. اختلال عاطفی فصلی      ۳. اختلال ادواری خوبی      ۴. اختلال افسرده کیم

۴- سطح پایین ملاتونین باعث ایجاد کدام حالت در فرد می شود؟

۱. خلق پایین      ۲. هیپومانی      ۳. خلق بالا و سرخوشی      ۴. غمگینی مفرط

۵- کدام دسته از اختلالات تاریخچه پژوهشی کوتاهی را به خود اختصاص داده است؟

۱. عاطفی فصلی      ۲. افسرده خوبی      ۳. دو قطبی نوع I      ۴. مانیک دپرسیو

۶- فرد مبتلا به کدام اختلال ممکن است بوسیله اعمال دیگران ناکامی را تجربه کند؟

۱. مانیک      ۲. افسرده خوبی      ۳. اسکیزوفرنی اساسی      ۴. افسرده کیم

۷- کدامیک از اختلالات زیر اختلال مزمنی است که حداقل ۲ سال ادامه دارد و فرد مبتلا، هیپومانی را به صورت دوره ای تجربه می کند؟

۱. دو قطبی      ۲. عاطفی فصلی      ۳. ادواری خوبی      ۴. افسرده کیم

۸- لیتیوم برای درمان کدام اختلال موثر می باشد؟

۱. استرس      ۲. اضطراب      ۳. افسرده کیم      ۴. دو قطبی

۹- کدام نوع اسکیزوفرنی هم اکنون در کشورهای صنعتی به ندرت دیده می شود؟

۱. آشفته      ۲. پارانویید      ۳. باقی مانده      ۴. کاتاتونیک

۱۰- فقر گفتار، بی حالتی عاطفی، فقدان لذت، انزوا از ویژگی کدام دسته از اسکیزوفرنی می باشد؟

۱. پارانویید      ۲. آشفته      ۳. مثبت      ۴. منفی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۰۹۸ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱ - ، روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۰

۱۱- بر اساس مطالعات لیدل و همکاران کاهش RCBF در کرتکس پره فرونتال میانی و چپ منجر به چه عاملی می شود؟

- ۲. افزایش مسائل مربوط به حرکت
- ۴. افزایش هیجانات
- ۱. فقر روانی-حرکتی
- ۳. کاهش سازمان نیافتگی

۱۲- بر چه اساسی می توان ناهماهنگی دو قلوهای یک تخمکی را درابتلا به اسکیزوفرنی تمیز داد؟

- ۲. بررسی بطن ها و کاهش حجم کرتکس تمپورال
- ۴. افزایش حجم کرتکس تمپورال
- ۱. کاهش فعالیت آلفا در نیمکره چپ

۱۳- بر طبق پژوهش بارچ و همکاران (۲۰۰۲) کدام ناحیه در بیماران اسکیزوفرنی در دو حافظه کاری و بلند مدت کاهش فعالیت را نشان می دهد؟

- ۲. لوب تمپورال میانی
- ۴. کرتکس پره فرونتال دورسولا ترال راست
- ۱. کرتکس سینگولار قدامی دو طرف

۱۴- ممانعت از جذب کدام دسته از داروها در مکان گیرنده پس سیناپسی از انتقال دوپامین جلوگیری می کند؟

- ۴. فتوتیازین
- ۳. سرتالین
- ۲. فنوبارتیال
- ۱. ترازادون

۱۵- بررسی های پس از مرگ بیماران اسکیزوفرنیک کاهش در تراکم نورون های کدام قسمت را نشان می دهند؟

- ۴. هیپوتالاموس
- ۳. پیشانی
- ۲. تalamus
- ۱. هیپوکامپ

۱۶- چه کسی معتقد بود که هذیان ها، اعمال گفتاری خالی هستند که به دنیا و خویشتن معطوف نیستند و آنها نماد چیزی نیستند؟

- ۴. آدل دیاموند
- ۳. بریوس
- ۲. همزلی
- ۱. بنتال

۱۷- کدام دارو اثر مستقیمی بر روی توهمات و هذیان ها دارد؟

- ۴. پروکستین
- ۳. فلوكسامین
- ۲. ترازادون
- ۱. کلوزاپین

۱۸- یبوست، آشفتگی های بینایی و کاهش یا افزایش وزن از عوارض کدام دارو محسوب می شود؟

- ۴. کلرپرومازین
- ۳. کلوزاپین
- ۲. پروزاک
- ۱. دسی پرامین

۱۹- کدام یک از موارد زیر از ویژگی های تشخیصی اختلال شخصیتی اسکیزوتاپیال محسوب می شود؟

- ۴. از نظر هیجانی سرد
- ۳. حساسیت
- ۲. فقد انعطاف پذیری
- ۱. سوء ظن

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/ گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱ - ، روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۰

- ۲۰- کدام گزینه جز ویژگی های شخصیتی اختلال اسکیزوئید محسوب می شود؟

- |                        |                                |                      |
|------------------------|--------------------------------|----------------------|
| ۱. خسته کردن دیگران    | ۲. توانایی در ابراز مستقیم خشم | ۳. نابهنجاری در تفکر |
| ۴. فقدان اعتماد به نفس |                                |                      |

- ۲۱- شیوع کدام دسته از اختلالات شخصیتی، ۳ درصد جمعیت عمومی را شامل می شود؟

- |              |         |             |                 |
|--------------|---------|-------------|-----------------|
| ۱. دوری گزین | ۲. مرزی | ۳. خودشیفتہ | ۴. اسکیزوتابیال |
|--------------|---------|-------------|-----------------|

- ۲۲- در کدام دسته از اختلالات شخصیتی، تحت تاثیر استرس، واقعیت سنجی فرد به آسانی درهم می شکند؟

- |              |           |           |              |
|--------------|-----------|-----------|--------------|
| ۱. دوری گزین | ۲. وابسته | ۳. نمایشی | ۴. پارانویید |
|--------------|-----------|-----------|--------------|

- ۲۳- شیوع اختلال شخصیت نمایشی چند درصد می باشد؟

- |                |                |           |             |
|----------------|----------------|-----------|-------------|
| ۱. ۳ تا ۴ درصد | ۲. ۲ تا ۳ درصد | ۳. ۱ درصد | ۴. ۲/۵ درصد |
|----------------|----------------|-----------|-------------|

- ۲۴- رفتارهایی نظیر بریدن بازوها، پاها و سوزاندن، در کدام دسته از اختلالات شخصیتی مشاهده می گردد؟

- |               |                      |                 |              |
|---------------|----------------------|-----------------|--------------|
| ۱. ضد اجتماعی | ۲. اختلال شخصیت مرزی | ۳. سوسایی- جبری | ۴. اسکیزوئید |
|---------------|----------------------|-----------------|--------------|

- ۲۵- در کدام یک از اختلالات شخصیتی افراد در روابط بین فردی، به درجه بالایی از محبت نیاز دارند؟

- |              |             |           |            |
|--------------|-------------|-----------|------------|
| ۱. اسکیزوئید | ۲. خودشیفتہ | ۳. نمایشی | ۴. اجتنابی |
|--------------|-------------|-----------|------------|

- ۲۶- کدامیک از مشکلات روانشناختی در بین مبتلیان به بی اشتھایی روانی شایع می باشد؟

- |           |                 |              |          |
|-----------|-----------------|--------------|----------|
| ۱. اضطراب | ۲. افسردگی شدید | ۳. خودشیفتگی | ۴. استرس |
|-----------|-----------------|--------------|----------|

- ۲۷- تحریک کدام ناحیه باعث کاهش احساس گرسنگی می شود؟

- |                 |             |                      |                       |
|-----------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| ۱. هیپوتalamous | ۲. تalamous | ۳. هیپوتalamous شکمی | ۴. هیپوتalamous جانبی |
|-----------------|-------------|----------------------|-----------------------|

- ۲۸- کدام مورد جز اهداف مداخلات درمانی شناختی محسوب می شود؟

- |                        |                 |                         |                       |
|------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|
| ۱. ایجاد جذابیت جسمانی | ۲. کنترل فراخود | ۴. رشد و پرورش خودختاری | ۳. ایجاد اتحاد درمانی |
|------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|

- ۲۹- در فاصله سنی ۲۵ تا ۴۴ سال مردها بطور متوسط چند کیلو گرم افزایش وزن دارند؟

- |      |      |      |      |
|------|------|------|------|
| ۱. ۱ | ۲. ۵ | ۳. ۴ | ۴. ۲ |
|------|------|------|------|

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۰۹۸ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱ - ، روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۰

- ۳۰- در کدام مرحله خواب non-REM یک نوع الگوی فعالیتی متمایزی از امواج آهسته تر به همراه خیزک های سریعی از امواج نشان می دهد؟

۱. اول      ۲. دوم      ۳. سوم      ۴. چهارم

- ۳۱- کدام مورد محرك اشتها و هوشیاری محسوب می شود؟

۱. سروتونین      ۲. نوروترانسمیتر هیپوکرتین      ۳. اپی نفرین      ۴. دوپامین

- ۳۲- لیومان و همکاران ۱۹۹۱ اشیوع اختلال نعوظی را برای سنین ۴۰ الی ۴۹ سالگی چند درصد برآورد کرده اند؟

۱. ۱۱ درصد      ۲. ۷ درصد      ۳. ۱۳ درصد      ۴. ۱۸ درصد

- ۳۳- داروی ویاگرا در درمان کدام اختلال موثر واقع می شود؟

۱. ازال زودرس      ۲. بیزاری جنسی      ۳. میل جنسی کم کار      ۴. نعوظ

- ۳۴- کدام گزینه جز عوارض جنبی داروی سیلدنافیل محسوب می شود؟

۱. کاهش ضربان قلب      ۲. اختلال در دید رنگ      ۳. برافروختگی چشم ها      ۴. آشفتگی کلیوی

- ۳۵- کدام دانشمندبه این نتیجه دست یافت که مردان مبدل پوش به احتمال بیشتری نسبت به مردان دیگروالدین خود را فاقد ویژگی های مربوط به نوع جنس ارزیابی می کردد؟

۱. بن کرافت      ۲. مسترز      ۳. نیوکامب      ۴. جانسون

- ۳۶- در کدام نوع دماسن رفتارهای مشکل دار نظیر شگفتی واضح می باشند؟

۱. متوسط      ۲. مبهم      ۳. خفیف      ۴. شدید

- ۳۷- ژن های موجود در کروموزوم های ۱۴، ۱۹، ۲۱ در ایجاد کدام بیماری دخالت دارند؟

۱. پارکینسون      ۲. آلزایمر      ۳. ام اس      ۴. صرع

- ۳۸- عوامل خطر برای بروز زوال عقل در بیماران پارکینسونی شامل کدام مورد می شود؟

۱. جنسیت      ۲. مدت زمان بیماری      ۳. آستانه تحمل درد پایین      ۴. ژنتیک

- ۳۹- بی خوابی از جمله مشکلات روانی مبتلایان به کدام نوع بیماری می باشد؟

۱. ام اس      ۲. صرع      ۳. پارکینسون      ۴. آلزایمر

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۰۹۸ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱ - ، روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۰

۴۰- کدام دارو جز داروهای ضد صرع محسوب می شود؟

۴. پروکستین

۳. کاربامازپین

۲. سرتالین

۱. ترازومن

شماره سوال	پاسخ صحيح	وضعیت کلید
1	ب	عادی
2	د	عادی
3	ب	عادی
4	ج	عادی
5	الف	عادی
6	الف	عادی
7	ج	عادی
8	د	عادی
9	د	عادی
10	د	عادی
11	الف	عادی
12	الف	عادی
13	ج	عادی
14	د	عادی
15	ج	عادی
16	ج	عادی
17	الف	عادی
18	د	عادی
19	الف	عادی
20	الف	عادی
21	د	عادی
22	ج	عادی
23	ب	عادی
24	ب	عادی
25	د	عادی
26	الف	عادی
27	ج	عادی
28	د	عادی
29	ج	عادی
30	ب	عادی
31	ب	عادی
32	الف	عادی
33	د	عادی
34	ب	عادی
35	ج	عادی
36	الف	عادی
37	ب	عادی
38	ب	عادی
39	ج	عادی
40	ج	عادی