

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: مقدمات روانپژوهی

روش تحقیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۷۱۰۹۵

۱- مرحوم دکتر میرسپاسی عالیمی همچون سردرد و تپش قلب را در کدام مرحله از بیماری روانی قرار داده است؟

- ۱. مرحله آشتفتگی روحی
- ۲. مرحله اختلالات روانی
- ۳. دوره نشانه های نخستین
- ۴. مرحله اختلال جسمانی روانی

۲- رشد روان پزشکی به کدامیک از موارد زیر بستگی دارد؟

- ۱. رشد علم طب
- ۲. ارزشها و ساختارهای جامعه
- ۳. نگرش مردم
- ۴. کارکردهای روان پزشکی

۳- روان پزشکی کودک به بررسی کدام عوامل می پردازد؟

- ۱. توانایی مدارا با دیگران - رشد جسمی
- ۲. توانایی مدارا با دیگران - حل مسئله
- ۳. رشد جسمی-کفایت اجتماعی
- ۴. رشد جسمی-بلغ عاطفی

۴- از اهداف اخلاق درمانی کدام گزینه صحیح است؟

- ۱. جامعه درمانی-درمان انفرادی
- ۲. درمان گروهی- خانواده درمانی
- ۳. جامعه درمانی-درمان گروهی
- ۴. کار درمانی- گروه درمانی

۵- از دیدگاه کراپلین، سایکوز مشتمل بر کدام دسته از اختلالات روانی بوده است؟

- ۱. شیدایی-افسردگی
- ۲. زوال عقل-اسکیزوفرنی
- ۳. افسردگی-زوال عقل
- ۴. زوال عقل پیشرس- پارانویا و پیدایی-افسردگی

۶- کدامیک از اختلالات روانی، طبقه بزرگی را در DSMII به خود اختصاص داده بودند؟

- ۱. افسردگی
- ۲. نوروزها
- ۳. پارانویا
- ۴. سایکوزها

۷- درخصوص معیار آسیب پذیری یا آمادگی شخص در مقابل عوامل کننده کدام گزینه صحیح است؟

- ۱. شدت عوامل مستعد سازنده
- ۲. کنش متقابل شخصیت و عوامل آشکار کننده
- ۳. کنش متقابل شخصیت و عوامل مستعد سازنده
- ۴. کنش متقابل شخصیت و عوامل تحت بالینی

۸- برای تشخیص اختلال ادواری خوبی، نشانه های هیپومنیک حداقل چه مدت باید در فرد وجود داشته باشد؟

- ۱. ۳ سال
- ۲. ۱ سال
- ۳. ۶ ماه
- ۴. ۲ سال

۹- پیچیدگی افکار، احساسات و رفتار انسان بازتابی از کدام گزینه زیر است؟

- ۱. ژن ها
- ۲. میکروب ها
- ۳. مواد شیمیایی
- ۴. ناهمگونی درون مغز

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: مقدمات روانپژوهی

روش تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۷۱۰۹۵

۴. ناتوانی یادگیری

۳. اوتیسم

۲. دمанс

۱. افسردگی اساسی

۱۰- کدامیک از ناپهنجاری های روانی ناشی از نامتوازن بودن انتقال دهنده های عصبی است؟

۴. عوامل زیست شیمی

۳. بوم شناختی

۲. پزشکی

۱. زیست شناختی

۱۱- در کدامیک از دیدگاه های زیر، رفتار حاصل تعامل و تبادل بین افراد و محیط است؟

۴. اسکیزوفرنی

۳. اضطراب فراگیر

۲. ترس

۱. افسردگی

۱۲- کدامیک از گزینه های زیر معلول شناخت های ناسازگارانه است؟

۴. شرح حال خانوادگی

۳. مشخصات کلی

۲. بیماری های قبلی

۱. شکایت اصلی

۱۳- بحران های روانی معمولاً چه مدت به طول می انجامند؟

۱. یک هفته

۲. دو هفته

۳. چهار هفته

۴. یک تا چهار هفته

۱۴- کدامیک از بخش های شرح حال روان پزشکی، حلقه اتصال بین تاریخچه بیماری فعلی و تاریخچه شخصی مراجع است؟

۴. شرح حال خانوادگی

۳. مشخصات کلی

۲. بیماری های قبلی

۱. شکایت اصلی

۱۵- در کدامیک از مراحل مصاحبه فرضیات تشخیصی اولیه شکل می گیرد؟

۲. بدن مصاحبه

۱. مرحله آغازین

۴. مصاحبه با همراه بیمار

۳. مرحله نهایی

۱۶- در کدامیک از انواع مصاحبه، ابزار و مصاحبه گر، حداقل تأثیر را روی نتایج دارند؟

۲. مصاحبه نیمه ساختاری

۱. مصاحبه غیرساختاری

۴. مصاحبه بالینی

۳. مصاحبه ساختاری

۱۷- یکی از بهترین ابزارها برای اطلاع از تاریخچه خانوادگی کدامست؟

۲. مصاحبه مبتنی بر بررسی تاریخچه

۱. مصاحبه با رویکرد نقاط آشکار

۴. مصاحبه بالینی

۳. ژنوگرام خانوادگی

۱۸- نقصی که در آن ارتباط منطقی بین اندیشه ها مختل شده و هدف و مقصود از سخن معلوم نیست، چه نامیده می شود؟

۴. پرش افکار

۳. حاشیه پردازی

۲. خارج شدن از خط

۱. هذیان

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: مقدمات روانپژوهی

رشته تحصیلی/ گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۷۱۰۹۵

۱۹- از جمله مهمترین و خطرناک ترین نوع توهمندی کدام گزینه زیر می باشد؟

۱. توهمندی آمرانه ۲. توهمندی پس خوابی ۳. توهمندی دیداری ۴. توهمندی خوابی

۲۰- کدامیک از روش‌های ارزیابی معزز، از قدرت تفکیک و دقیق بیشتری برخوردار می باشد؟

۱. نوار معزز ۲. اسکن CT ۳. PET ۴. MRI

۲۱- میزان نسبی سمیت یا بی خطر بودن دارو چه نامیده می شود؟

۱. تحمل ۲. شاخص درمانی ۳. واپستگی ۴. منحنی واکنش به دوز

۲۲- بلوکاز گیرنده‌های موسکارینی استیل کولین موجب بروز کدامیک از عوارض ناشی از مصرف داروهای روان‌گردان می شوند؟

۱. اختلال در عملکرد جنسی ۲. افزایش وزن ۳. احتباس ادراری ۴. خشکی دهان و تاری دید

۲۳- در خصوص عملکرد بنزو دیازپین‌ها کدام گزینه صحیح است؟

۱. بنزو دیازپین‌ها در مقادیر بالا خواب آور می باشند ۲. بنزو دیازپین‌ها در مقادیر پایین خواب آور می باشند ۳. بنزو دیازپین‌ها در مقادیر بالا اضطراب زا می باشند

۲۴- کدامیک از داروهای زیر بیشتر از سایر داروهای سه حلقه‌ای، در درمان اختلال هول همراه با بازار هراسی به کار می رود؟

۱. کلومی پرامین ۲. ایمی پرامین ۳. دزی پرامین ۴. فلوکسیتین

۲۵- در کدام دسته از داروهای ضد افسردگی لزوم رعایت احتیاط‌های غذایی برای جلوگیری از بحران فشارخون وجود دارد؟

۱. مهارکننده‌های انتخابی بازجذب سروتونین ۲. بنزو دیازپین‌ها ۳. داروهای سه حلقه‌ای ۴. مهارکننده‌های مونوآمین اوکسیداز

۲۶- تنها دارویی که توسط FDA برای پیشگیری از دوره‌های افسردگی فصلی در بیماران دچار اختلال عاطفی فصلی تأیید شده کدام است؟

۱. بوپروپیون ۲. دولوکسیتین ۳. ونلافاکسین ۴. فلوکسیتین

۲۷- کدامیک از داروهای زیر، برای مبتلایان به اسکیزوفرنی که نمی توانند از داروهای ضد روان پریشی استفاده کنند، مفید است؟

۱. ریسپریدون ۲. کاربامازوپین ۳. لیتیوم ۴. لاموتریزین

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: مقدمات روانپژوهی

رشته تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۹۵۷۱۲۱۰

۴۸- کدامیک از انواع بیوفیدبک، بر اساس فعالیت غدد عرق می باشد؟

- ۲. الکترودرموگراف-پاسخ الکتریکی پوست
- ۴. الکتروومایوگراف
- ۱. بیوفیدبک حرارتی
- ۳. هموانسفالوگرافی

۴۹- درخصوص روشی که در آن شخص را برای مدت نسبتا طولانی در معرض محرک ترس آور قرار می دهند کدام گزینه صحیح است؟

- ۱. غرقه سازی
- ۲. خاموشی
- ۳. حساسیت زدایی منظم
- ۴. شکل دهی رفتار

۵۰- از عوامل اصلی محدود کننده کاربرد ECT (تشنج درمانی الکتریکی) کدام گزینه صحیح است؟

- ۱. سردرد
- ۲. نقصان حافظه و سردگمی
- ۳. تهوع و استفراغ
- ۴. سرگیجه

شماره سوال	پاسخ صحيح	وضعیت کلید
۱	ج	عادی
۲	ب	عادی
۳	ج	عادی
۴	الف	عادی
۵	د	عادی
۶	ب	عادی
۷	الف	عادی
۸	د	عادی
۹	د	عادی
۱۰	الف	عادی
۱۱	ج	عادی
۱۲	الف	عادی
۱۳	د	عادی
۱۴	ب	عادی
۱۵	الف	عادی
۱۶	ج	عادی
۱۷	ج	عادی
۱۸	ب	عادی
۱۹	الف	عادی
۲۰	د	عادی
۲۱	ب	عادی
۲۲	د	عادی
۲۳	الف	عادی
۲۴	ب	عادی
۲۵	د	عادی
۲۶	الف	عادی
۲۷	ج	عادی
۲۸	ب	عادی
۲۹	الف	عادی
۳۰	ب	عادی